herpy

SKILPADDER

Terrapene carolina

Terrapene carolina er en liten, høyhvelvet og landlevende myrskilpadde fra det østlige Nord-Amerika. Buskjoldet har et hengsel, slik at dyret kan lukke seg helt inne i skjoldet. Arten er dagaktiv, altetende og svært langlivet, men den krever fuktighet, en stor innhegning, rolig stell og som regel en omhyggelig styrt vinterdvale.

Familie: Emydidae Engelsk: Common Box Turtle Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**11-20 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**40-50 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Varmeplass	**29-31 °C**
Temperatur, natt	**10-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål** dybde 2-5 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, frukt, ferdigfôr, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-8 egg**
Inkubasjon	**50-90 dager** ved 26-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Terrapene carolina trives best i en stor, sikker innhegning utendørs, og en stor innhegning er alltid bedre enn en liten. Velg en solrik, vindbeskyttet plass med godt drenert jord, morgensol og skygge hele dagen.

TEMPERATUR

Innendørs skal det være en soleplass på 29-31 °C og en kjølig sone på 21-24 °C. Bruk 50 W halogenspoter, én til en ung skilpadde og minst to til en voksen, og mål overflatetemperaturen på soldekket med en digital sonde.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

T. carolina kommer fra fuktige leveområder og trives ved en gjennomsnittlig luftfuktighet på 60-80 %, som aldri må falle under ca. 50 %.

LYS OG UVB

T. carolina er dagaktiv og trenger kraftig lys og UVB for å danne vitamin D3. Bruk et T5 HO UVB-rør på ca. 6 % over solplassen, slik at det overlapper varmelampene.

FÔRING

T. carolina er altetende. De første 5-6 årene er unge dyr for det meste kjøttetere, mens voksne spiser mer plantekost.

ATFERD OG HÅNDTERING

T. carolina er sky og lite egnet til å tas opp. Mange dyr lærer likevel eieren sin å kjenne, tar mat ut av fingrene og setter pris på en lett skjoldmassasje.

NATURLIG UTBREDELSE

USA, Mexico og Canada.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/skildpadder/terrapene-carolina