herpy

SKILPADDER

Eastern Snake-necked Turtle

Chelodina longicollis

Chelodina longicollis er en middels stor, kjøttetende ferskvannsskilpadde fra det sørøstlige Australia. Halsen er så lang at den når omtrent 60 % av skjoldets lengde, og dyret fanger byttet med et lynraskt utfall fra bunnen. Hunnene blir opptil 28 cm. Arten krever et stort, dypt og rent vannkar med en solplass, og den er et dyr å se på, ikke å ta opp.

Familie: Chelidae Tidligere navn: *Chelodina novaehollandiae*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-28 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**450-820 g**
Levealder	**30-50 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 75 × 65 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**30-34 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 35-40 cm
Vanntemperatur	**22-25 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**84-144 mnd.**
Kullstørrelse	**6-24 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**110-185 dager** ved 26-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Hold *Chelodina longicollis* i et akvarium eller et kar, ikke i et vanlig terrarium. Arten er en bunnlevende svømmer og trenger dybde mer enn solplass.

TEMPERATUR

Vannet skal være 22-25 °C. Temperaturen holdes med en termostatstyrt vannvarmer, og det måles både i vannet og over det.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Skilpaddens fuktighet er vannet, så luftfuktigheten er ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er tilstrekkelig. Det viktige er rent vann. Skift omtrent en fjerdedel til en tredjedel av vannet hver uke, og fjern fôrrester etter måltidet.

VANN OG VANNKVALITET

Vannet er dyrets oppholdssted. Det skal være 35-40 cm dypt for voksne dyr (minst dobbelt så dypt som skjoldet er bredt), oksygenrikt, rent og 22-25 °C varmt.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og avhengig av UV-lys for knoklene. Den bruker mindre tid på solplassen enn *Trachemys scripta*, men UVB er likevel nødvendig. Ferguson-sone 2 er et anslag ut fra den atferden; sonen er ikke dokumentert for arten.

FÔRING

Chelodina longicollis er kjøtteter. Føden skal være animalsk og variert: meitemark, blodmark og svartmark, siriss og andre insekter, små fisk som guppyer, reker, krill, muslinger og snegler.

ATFERD OG HÅNDTERING

Chelodina longicollis er et dyr å observere. Den er ikke sosialt anlagt og lever alene i naturen, og i et kar oppstår det ofte kamp mellom to dyr, fordi det dominerende vokser raskere. Hold derfor ett dyr.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.