herpy

SKILPADDER

Red-Footed Tortoise

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius er en mellomstor, mørk landskilpadde fra Sør-Amerikas savanner og skogkanter med røde til oransje skjell på hode og bein. Skjoldet blir vanligvis 30-35 cm langt, dyret lever i minst 50 år og er en av de mest holdte tropiske landskilpaddene. Den trenger høy luftfuktighet og varme hele året og spiser både planter, frukt og litt animalsk føde.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**50-70 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Savanne, tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**280 × 140 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, frukt, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2-7 egg**
Inkubasjon	**105-200 dager** ved 28-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Chelonoidis carbonarius er en aktiv skilpadde som bruker all den plassen den får. Den lever på bakken, så gulvareal er viktigere enn høyde. I Norden er det innendørs terrariet dyrets egentlige hjem mesteparten av året.

TEMPERATUR

Innendørs må det være en gradient. Lufttemperaturen er 24-29 °C om dagen, og solplassen under varmelampen er 32-35 °C, målt på selve underlaget.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten kommer fra et varmt og fuktig klima og må ha høy luftfuktighet: 70-90 %, med korte topper opp mot 100 %.

LYS OG UVB

C. carbonarius er dagaktiv og må ha UVB når den ikke er i direkte sol. Mål UV-indeksen 2,0-3,0 på solplassen (Ferguson-sone 2).

FÔRING

C. carbonarius er altetende og spiser i naturen planter, blomster, frukt, sopp og litt animalsk føde. I fangenskap fungerer en fordeling på omtrent 90 % plantemateriale og 10 % animalsk føde.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er nysgjerrig, aktiv og forholdsvis rolig. Den lærer holderen å kjenne, kommer gjerne til når det er mat, og tar mat fra en hånd eller en pinsett.

NATURLIG UTBREDELSE

Panama, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasil, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina og Trinidad og Tobago.