herpy

SKILPADDER

Painted Turtle

Chrysemys picta

Chrysemys picta er en dagaktiv, halvt vannlevende skilpadde fra Nord-Amerika med røde og gule striper på hals, ben og skjoldkant. Skjoldet blir 13-25 cm, og dyret kan leve i mange tiår. Et voksent dyr trenger et stort, filtrert kar med flere hundre liter vann, en varm solplass og kraftig UVB.

Familie: Emydidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**13-25 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**300-500 g**
Levealder	**25-40 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**130 × 65 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Varmeplass	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**15-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 25-35 cm
Vanntemperatur	**21-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**4-15 egg**
Kull per år	**1-5**
Inkubasjon	**72-80 dager** ved 25-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold dyret i et akvarium, et stort kar eller en lukket innendørs dam, ikke i et vanlig terrarium.
TEMPERATUR	Overflaten på solplassen skal være omtrent 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer etter at lampene er slått på, og luften over solplassen 30-35 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Skilpaddens fuktighet er selve vannet, så luftens relative fuktighet er ikke nærmere dokumentert for arten og er ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er rikelig. Det avgjørende er vannets renhet.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er dyrets oppholdssted, så det må være dypt, rent og varmt. Vannet må være minst dobbelt så dypt som skjoldet er bredt, og 25-35 cm passer for voksne dyr. Temperaturen er 24-27 °C (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighet. Arten hører til Ferguson-sone 3-4. UV-indeksen på overflaten av solplassen skal være omtrent 3,0-4,0, og det kan gjerne være områder med lavere UV-indeks, slik at dyret kan velge.
FÔRING	*C. picta* er altetende. I naturen spiser den vannplanter, alger, vanninsekter, krepsdyr, snegler, små fisker og åtsler. De unge dyrene er mest kjøttetende, og med alderen blir kosten mer plantebasert.
ATFERD OG HÅNDTERING	*C. picta* er dagaktiv, sky og rask til å flykte ned i vannet. Den er ikke temmet og trives ikke med kontakt, så den skal bare håndteres når det er nødvendig, for eksempel ved helsesjekk eller rengjøring.
NATURLIG UTBREDELSE	Canada, USA og Mexico.