herpy

SKILPADDER

European Pond Turtle

Emys orbicularis

Emys orbicularis er en dagaktiv, halvt vannlevende ferskvannsskilpadde fra det sørlige, sentrale og østlige Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia. Skjoldet blir typisk 15-20 cm, og dyret kan leve i mange tiår. Arten stelles best i en stor, solrik og rømningssikker hagedam, der den også kan overvintre, og den krever sol eller UVB, varme om sommeren og en kald vinterhvile.

Familie: Emydidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-23 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**400-700 g**
Levealder	**30-100 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 65 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**35 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 30-40 cm
Vanntemperatur	**24-28 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-16 uker
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48-216 mnd.**
Kullstørrelse	**3-20 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**60-120 dager** ved 26-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Voksne *Emys orbicularis* holdes best utendørs i en inngjerdet hagedam med sol, planter og myk bunn.
TEMPERATUR	I en utendørs dam følger temperaturen årstiden, og dyrene regulerer selv varmen sin ved å sole seg. Dammen skal ligge solrikt og i le.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten er ikke avgjørende for en vannskilpadde, og 50-80 % i rommet er rikelig. Det avgjørende er vannets renhet. Dyret avgir avføringen i vannet, og vannet blir raskt skittent i et akvaterrarium.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er dyrets oppholdssted, så det skal være dypt, rent og fullt av skjul. Innendørs skal voksne ha 30-40 cm vann ved 24-28 °C.
LYS OG UVB	Utendørs får dyret solens egen UVB når det ikke er glass eller tett nett imellom, og solplassene skal ligge i full sol det meste av dagen. Innendørs er UVB nødvendig.
FÔRING	*Emys orbicularis* er altetende med hovedvekt på smådyr. I naturen spiser den insekter og larvene deres, særlig øyenstikkernymfer, snegler, krepsdyr, ormer, rumpetroll og døde fisk, men også vannplanter.
ATFERD OG HÅNDTERING	*E. orbicularis* er dagaktiv og i naturen sky og forsiktig. I fangenskap blir den raskt vant til stelleren sin og kommer bort til fôringsstedet, men den liker ikke å bli håndtert.
NATURLIG UTBREDELSE	Marokko, Algerie, Tunisia, Portugal, Spania, Frankrike, Italia, Tyskland, Østerrike, Polen, Ungarn, Slovakia, Romania, Bulgaria, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Nord-Makedonia, Albania, Hellas, Tyrkia, Ukraina, Moldova, Hviterussland, Litauen, Latvia, Russland, Kasakhstan, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Iran og Turkmenistan.