herpy

SKILPADDER

Elongated Tortoise

Indotestudo elongata

Indotestudo elongata er en mellomstor landskilpadde fra skoger og kratt i Sørøst-Asia og det nordøstlige India. Skjoldet er lysegult med svarte flekker, og voksne dyr blir omtrent 30 cm. Arten er sjenert, mest aktiv ved daggry og skumring og krever varme, høy luftfuktighet og et vannkar å bade i. Den er kritisk truet i naturen, og bare dyr fra oppdrett kan holdes forsvarlig.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Testudo elongata; Geochelone elongata*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-35 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**3 000-3 500 g**
Levealder	**30-50 år**
Aktiv	**I skumringen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**240 × 120 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**70-85 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Frukt, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48-96 mnd.**
Kullstørrelse	**3-5 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**100-120 dager** ved 29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Indotestudo elongata må ha et stort, åpent gulvareal med fuktig underlag og mange gjemmesteder. Gulvarealet er viktigere enn høyden. Innendørs fungerer en åpen skilpaddekasse eller et stort plastkar best.

TEMPERATUR

Luften skal være 26-30 °C om dagen.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være høy, omtrent 70-85 %, med en tørr og en fuktig sone, slik at dyret selv kan velge. Underlaget er fuktig, men ikke vått, og gjemmestedene fuktes jevnlig.

LYS OG UVB

Indotestudo elongata er skogsboende og unngår sterkt lys, men trenger D3-vitamin. Den beste løsningen er opphold utendørs i halvskygge, der noe sol slipper gjennom; glass og plexiglass stopper UVB.

FÔRING

Indotestudo elongata er altetende med planter som hovedbestanddel. Basis er blader som romersalat, endivie, løvetann, groblad og hibiskusblader med revne grønnsaker som squash, søtpotet, gulrot, erter og agurk.

ATFERD OG HÅNDTERING

Indotestudo elongata er sjenert og mest aktiv ved daggry og skumring, men blir også aktiv etter varm regn. Dyret må ha flere gjemmesteder og må ikke forstyrres hele tiden.

NATURLIG UTBREDELSE

Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Kambodsja, Vietnam, Malaysia og Kina.