herpy

SKILPADDER

Eastern Mud Turtle

Kinosternon subrubrum

Kinosternon subrubrum er en liten, mørk sumpskilpadde fra det sørøstlige USA. Skjoldet blir 8-12 cm, og arten går mest langs bunnen av grunt, plantebevokst vann. Den har to bevegelige hengsler på buskjoldet, slik at den kan lukke seg nesten helt inne, og den kan leve 20-50 år. Arten er sky og mest aktiv i skumringen og må ha et filtrert kar med grunt vann, varmelampe og UVB.

Familie: Kinosternidae Tidligere navn: *Kinosternon pensylvanicum*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-12 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**90-260 g**
Levealder	**20-50 år**
Aktiv	**I skumringen**
Levevis	**Gravende og semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**30-33 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-20 cm
Vanntemperatur	**21-24 °C**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36-96 mnd.**
Kullstørrelse	**2-5 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**75-125 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Kinosternon subrubrum* holdes i et akvarium eller et lavt kar med landdel, ikke i et vanlig terrarium.
TEMPERATUR	Vannet skal være 21-24 °C, og en vannvarmer med skjerm er normalt nødvendig. Solplassen skal være 30-33 °C målt på overflaten, og luften i karet 24-29 °C om dagen. Om natten kan temperaturen falle til 20-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten betyr lite for en vannskilpadde; 40-60 % i rommet er passende. Luften over karet må ikke være kald eller trekkfull, for det øker risikoen for luftveisinfeksjoner. Vannet skal være klart og rent.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er 15-20 cm dypt for voksne dyr, med flate og lavere partier der dyret kan hvile og rekke halsen opp til overflaten. Arten er en svak svømmer, så dypt vann gir stress. Temperaturen er 21-24 °C (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er anbefalt, slik at dyret kan danne D3-vitamin og ta opp kalk, og solplassen må ha både varmelampe og UVB-rør, selv om arten bare soler seg sjelden. Sone 2 passer, fordi arten er skumringsaktiv og ikke soler seg mye.
FÔRING	*Kinosternon subrubrum* er altetende, men overveiende kjøttetende. I naturen eter den snegler, muslinger, ormer, insekter, edderkopper, krepsdyr, rumpetroll, åtsel, alger, vannplanter og frø.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Kinosternon subrubrum* er sky og aktiv, særlig i skumringen, og den sees mest når den undersøker bunnen. Den er ikke et dyr å ta opp: den kan bite hardt med hornnebbet og avgi en illeluktende væske.
NATURLIG UTBREDELSE	USA.