herpy

SKILPADDER

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus er en middels stor skilpadde fra det vestlige og sentrale Afrika. Skjoldet blir 18-28 cm, og arten kan bli 30-50 år. Den er hardfør, aktiv og grådig og krever et stort, filtrert kar med varmt vann, en varm solplass og UVB. Dyrene trekker hodet inn til siden under skjoldkanten, og hannene jager hunnene hardt.

Familie: Pelomedusidae Tidligere navn: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-28 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**30-50 år**
Aktiv	**Om dagen og om natten**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Savanne, regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 75 × 50 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**32-36 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 15-25 cm
Vanntemperatur	**24-27 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**11-27 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**53-75 dager** ved 27-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Hold dyret i et stort akvarium eller et kar, ikke i et vanlig terrarium. Karet må være minst fem ganger så langt som skjoldet og halvparten så bredt som det er langt, og landdelen regnes med i bunnarealet.

TEMPERATUR

Vannet skal være 24-27 °C. Varmere vann gjør dyret urolig, og i kjøligere vann mister det appetitten og søker etter varme. En vannvarmer bak en plastskjerm er normalt nødvendig, med mindre rommet er varmt nok.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten betyr lite for en vannskilpadde; 50-80 % i rommet er passende. Luften over karet må være varm og uten trekk, for kald og fuktig luft øker risikoen for luftveisinfeksjoner.

VANN OG VANNKVALITET

Vannet må holdes rent, fordi arten ikke skifter skjoldplatene, så smuss blir sittende på skjoldet. Vanndybden er 15-25 cm for voksne dyr, gjerne gradvis skrånende, og omtrent 10 cm for unger.

LYS OG UVB

UVB er nødvendig for D3-vitamin og kalkopptak, og det hemmer dessuten bakterier på skjoldet. Voksne dyr soler seg mye, så det må være en tørr, varm solplass med en kraftig lampe, og unger må også ha solplass.

FÔRING

Pelusios castaneus er altetende, men heller kraftig mot kjøtt. I naturen spiser den krepsdyr, insekter, fisk, reker, krabber og store snegler samt litt vegetasjon som vannsalat og frø.

ATFERD OG HÅNDTERING

Pelusios castaneus er rolig, nysgjerrig og aktiv. Dyrene trekker seg som regel inn når de håndteres, biter sjelden, men kan klore med de skarpe klørne for å komme løs.

NATURLIG UTBREDELSE

Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Ekvatorial-Guinea, Gabon, Kongo-Brazzaville, Kongo, Angola, Den sentralafrikanske republikk og São Tomé og Príncipe.