herpy

SKILPADDER

River cooter

Pseudemys concinna

Pseudemys concinna er en stor, dagaktiv ferskvannsskilpadde fra elver og innsjøer i det østlige og sentrale USA, med et flatt skjold prydet av gule virvler. Skjoldet kan bli over 40 cm, og dyret kan leve i flere tiår. Et voksent dyr krever et veldig stort, filtrert kar med flere hundre liter vann, en varm solplass, kraftig UVB og et overveiende plantebasert kosthold.

Familie: Emydidae Engelsk: River Cooter

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**22-44 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-44 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**220 × 110 × 70 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-31 °C**
Varmeplass	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 30-45 cm
Vanntemperatur	**21-31 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**10-20 egg**
Kull per år	**1-6**
Inkubasjon	**80-150 dager** ved 26-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold dyret i et stort akvarium, et kar eller en lukket innendørs dam, ikke i et vanlig terrarium. Temperaturer, lys og fôringsplan er lånt fra den nært beslektede *Trachemys scripta*, som lever i de samme vannene.
TEMPERATUR	Overflaten på solplassen skal være omtrent 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer etter at lampene er slått på, og luften over den 30-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Skilpaddens fuktighet er selve vannet, så luftfuktigheten er ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er passende. Det avgjørende er at vannet er rent.
VANN OG VANNKVALITET	Vannet er dyrets oppholdssted, så det skal være dypt, rent og varmt. Vannet må være minst dobbelt så dypt som skjoldet er bredt, og 30-45 cm passer for voksne dyr. Temperaturen er 21-31 °C for voksne dyr (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighet. Arten er dagaktiv, soler seg mye og hører til Ferguson-sone 3. UV-indeksen på solplassens overflate skal være 3,0-4,0 og lavere andre steder i oppstillingen, slik at dyret kan velge.
FÔRING	*P. concinna* spiser i naturen mest vannplanter, gress og alger og tar også planter ved vannkanten og nedfalne frukter; den har tannlignende spisser i overkjeven som hjelper til med å rive over fibrige blader.
ATFERD OG HÅNDTERING	*P. concinna* er dagaktiv og veldig sky: ved den minste bevegelse eller lyd glir den fra solplassen ut i vannet. Den liker ikke å bli håndtert og skal bare løftes når det er nødvendig.
NATURLIG UTBREDELSE	USA.