herpy

SKILPADDER

Florida Red-bellied Cooter

Pseudemys nelsoni

Pseudemys nelsoni er en stor, dagaktiv ferskvannsskilpadde fra stille innsjøer, dammer og myrer med tett plantevekst i Florida og det ytterste sørøstlige Georgia. Skjoldet er høyt og mørkt med røde striper, og buken er gulorange til rødlig. Hunnen kan nå 38 cm skjoldlengde, og voksne dyr er planteetere. Et voksent dyr krever et svært stort, filtrert kar, en varm solplass og kraftig UVB.

Familie: Emydidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-38 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-33 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**200 × 100 × 70 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-31 °C**
Varmeplass	**30-40 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 30-45 cm
Vanntemperatur	**21-31 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, ferdigfôr, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36-96 mnd.**
Kullstørrelse	**7-26 egg**
Kull per år	**3-6**
Inkubasjon	**45-80 dager** ved 25-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Hold dyret i et stort akvarium, et kar eller en lukket innendørs dam, ikke i et vanlig terrarium.
TEMPERATUR	Hos *Pseudemys nelsoni* skal overflaten på solplassen være omkring 40 °C, målt med et infrarødt termometer et par timer etter at lampene er slått på, og luften over den 30-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	*Pseudemys nelsoni* lever i vannet, så luftfuktigheten er ikke avgjørende; 50-80 % i rommet er passende. Det avgjørende er vannets renhet.
VANN OG VANNKVALITET	*Pseudemys nelsoni* lever i vannet, så det må være dypt, rent og varmt. Vannet må være minst dobbelt så dypt som skjoldet er bredt, og 30-45 cm passer for voksne dyr. Temperaturen er 21-31 °C for voksne dyr (se Temperatur).
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighet. *Pseudemys nelsoni* er dagaktiv, soler seg mye og hører til Ferguson-sone 3. UV-indeksen på overflaten av solplassen må være 3,0-4,0 og lavere andre steder i oppstillingen, slik at dyret kan velge.
FÔRING	*Pseudemys nelsoni* er en utpreget planteeter. Bortsett fra de helt små ungene, som også tar små insekter, spiser den i naturen bare vannplanter som vallisneria, vasspest, andemat og pilblad samt alger.
ATFERD OG HÅNDTERING	*P. nelsoni* er dagaktiv og soler seg i store grupper. Den er sky og glir ved den minste forstyrrelse fra solplassen og ned i vannet, men venner seg til faste rutiner.
NATURLIG UTBREDELSE	USA.