herpy

SKINKER

Cyclodomorphus gerrardii

Cyclodomorphus gerrardii er en slank, rolig skink fra det østlige Australia med lyserød tunge, mørke tverrbånd og en lang, svakt gripende hale. Arten blir 40-45 cm lang, lever i fuktig skog, er mest aktiv i skumringen og om natten og lever i naturen nesten bare av snegler. Den får levende unger, ofte mange i hvert kull, og voksne dyr er svært medgjørlige.

Familie: Scincidae Engelsk: Pink-Tongued Lizard Tidligere navn: *Hemisphaeriodon gerrardii; Tiliqua gerrardii; Hinulia gerrardii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**40-45 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Varmeplass	**33-36 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**16-22 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter, frukt, ferdigfôr, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**22-36 mnd.**
Kullstørrelse	**10-30 unger**
Drektighet	**90-120 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Arten graver, men klatrer også litt i skråstilte grener og korkbark, så en lett klatrestruktur er et pluss.

TEMPERATUR

Lufttemperaturen skal være 25-30 °C om dagen, med en kjølig ende på 20-25 °C. Overflaten på solplassen skal være 33-36 °C. Mål overflatetemperaturen med et infrarødt termometer og lufttemperaturen i begge ender.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten kommer fra fuktig skog, og en luftfuktighet på 60-80 % er passende. Opplysningene varierer fra 50-70 % til 70-90 %, og ved den høye enden skal terrariet være godt ventilert.

LYS OG UVB

Dyret er mest aktivt i skumringen og om natten og lever i skogbunnen, men har nytte av svak UVB.

FÔRING

I naturen lever *Cyclodomorphus gerrardii* nesten utelukkende av snegler og nakensnegler, og de store, flate tennene bakerst i munnen brukes til å knuse sneglehus. Snegler er derfor den største utfordringen i stellet.

ATFERD OG HÅNDTERING

Voksne dyr er blant de mest rolige og medgjørlige skinkene. De beveger seg langsomt og er lette å løfte. Unger er sjenertere og tømmer tarmen ved håndtering, så håndtering holdes på et minimum til dyret er vant til deg.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.