herpy

SKINKER

Egernia stokesii

En robust, sosial skink med piggete hale fra det halvtørre Australia. *Egernia stokesii* lever i faste familiegrupper i fjellsprekker og hule trestammer, føder levende unger og kan sperre skjulet sitt med den piggbesatte halen. Den krever varme, UVB og et terrarium med solide fjellstrukturer.

Familie: Scincidae Engelsk: Gidgee Skink Tidligere navn: *Silubosaurus stokesii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**21-28 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**100-200 g**
Levealder	**10-25 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og klippelevende**
Biotop	**Halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**43-49 °C**
Temperatur, natt	**21-27 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt og planter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**1-8 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**90 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Egernia stokesii lever i grupper, og terrariet må være stort nok til dem. Et par eller en liten gruppe på opptil tre skal ha minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde).

TEMPERATUR
Terrariet skal ha en tydelig gradient. Solplassen skal være 43-49 °C, målt på overflaten med et infrarødt termometer, og den kjølige enden skal ligge på omtrent 27 °C. Dagtemperaturen i bakgrunnen er 27-32 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Arten kommer fra halvtørre områder, men trives best med en luftfuktighet på 40-60 %. Forstøv terrariet lett om morgenen et par ganger i uken, og hold et fuktig skjul i den kjølige enden.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal ha UVB så lenge lyset er på. Et T5 HO-rør i reflektor, som dekker omtrent halvparten av terrariets lengde, gir Ferguson-sone 3.

FÔRING
Egernia stokesii er altetende. I naturen spiser voksne dyr mest planter: blader, blomster, frukt og frø, og plantedelen er størst om sommeren. Unge dyr spiser flere insekter enn voksne.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er sosial og lever i familiegrupper med et par, unger og halvvoksne avkom fra flere kull. Den kan holdes i par eller i en liten gruppe, særlig hvis dyrene er vokst opp sammen.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.