herpy

SKINKER

Lamprolepis smaragdina

Lamprolepis smaragdina er en slank, dagaktiv skink som lever i trærne på øyene i Sørøst-Asia og det vestlige Stillehavet. Den er som regel smaragdgrønn med brune, hvitprikkede bakben og bruker mesteparten av tiden på stammer og greiner. I terrariet må den ha høyde, varme, kraftig UVB og høy luftfuktighet, og den egner seg best som utstillingsdyr.

Familie: Scincidae Engelsk: Emerald Skink Tidligere navn: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**7-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**33-36 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-13 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**69-100 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et enkelt voksent *Lamprolepis smaragdina* trenger et terrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre, særlig i høyden. Arten er trelevende, så høyden er viktigere enn gulvarealet.

TEMPERATUR

Solplassen for *Lamprolepis smaragdina* skal være omtrent 35 °C, målt på selve greinen med en digital følerprobe. Den kjølige siden skal være 24-29 °C, og om natten skal temperaturen være 20-25 °C. Varmekilden slås av om natten.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten i terrariet til *Lamprolepis smaragdina* skal være omtrent 70 % om dagen og stige mot 100 % om natten. Sprøyt terrariet morgen og kveld, helst når det er mørkt, og gjerne lett igjen om ettermiddagen.

LYS OG UVB

Lamprolepis smaragdina er dagaktiv og lever i solbeskinte trær, så arten trenger kraftig UVB og sterkt lys.

FÔRING

Lamprolepis smaragdina er først og fremst insektetende, men tar litt frukt og blomster. Grunnfôret kan være sirisser, kakerlakker (for eksempel *Blaptica dubia*), gresshopper og andre varierte insekter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Lamprolepis smaragdina er rask og sky og bedre som utstillingsdyr enn som dyr til håndtering. Et nytt dyr må få minst to uker i fred. Spiser det ikke etter den tiden, bør det til dyrlege før det håndteres.

NATURLIG UTBREDELSE

Filippinene, Indonesia, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Mikronesiaføderasjonen, Marshalløyene, Palau og Øst-Timor.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/skinker/lamprolepis-smaragdina