herpy

SKINKER

Lamprolepis smaragdina

Lamprolepis smaragdina er en slank, dagaktiv skink som lever i trærne på øyene i Sørøst-Asia og det vestlige Stillehavet. Den er som regel smaragdgrønn med brune, hvitprikkede bakben og bruker mesteparten av tiden på stammer og greiner. I terrariet må den ha høyde, varme, kraftig UVB og høy luftfuktighet, og den egner seg best som utstillingsdyr.

Familie: Scincidae Engelsk: Emerald Skink Tidligere navn: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**7-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**33-36 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-13 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**69-100 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Lamprolepis smaragdina er en slank skink med spisst hode, lange tær og glatte, runde skjell. Grunnfargen er skinnende grønn, ofte med brune bakben som er flekket med hvitt, og gule øyelokk rundt de svarte øynene. Fargen varierer mye: noen dyr er svartprikkede, delvis brune eller helt brune, og på enkelte øyer finnes nesten blå dyr. Undersiden er lysere. Halen er opptil halvannen gang så lang som kroppen og kan kastes av hvis dyret blir grepet.

Arten blir 20-25 cm inkludert hale, og kroppen fra snute til kloakk er opptil 12 cm. Hannene er territorielle og forsvarer et område med flere hunner. Både ved forsvar av territoriet og ved frieri nikker hannene med hodet.

Navnet smaragdina betyr smaragdgrønn på latin og peker på fargen. Slektsnavnet *Lamprolepis* kommer trolig av det greske ordet for skinnende og ordet for skjell, og det passer på de glatte, blanke skjellene. *L. smaragdina* er lett å kjenne igjen, men den er delt i flere underarter og lokale former som i handelen går under samme navn. De mest forskjellige bestandene lever på Sulawesi. Arten er sky og rask og best som et dyr man ser på, ikke et dyr man håndterer.

Utbredelse og leveområde

Lamprolepis smaragdina har et svært stort utbredelsesområde. Den finnes på Filippinene, store deler av Indonesia (fra Lombok og Sulawesi til Molukkene og Ny-Guinea), Øst-Timor, Bismarckøyene og Admiralitetsøyene, Salomonøyene (til og med Santa Cruz-øyene) og videre ut over Palau og Carolinene i Mikronesia til Marshalløyene. Arten har spredt seg over havet til selv svært små øyer, og bestandene på de fjerne Stillehavsøyene er de yngste. På Saipan i Nord-Marianene er den innført.

> **Naturlig utbredelse:** Filippinene, Indonesia, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Mikronesiaføderasjonen, Marshalløyene, Palau og Øst-Timor.

LEVEOMRÅDE

Lamprolepis smaragdina er knyttet til trær. Den finnes i skog med åpent kronetak i lavlandet, i mangrove, i kokosplantasjer og i trær i hager og parker, og den tilbringer nesten hele livet på stammer og greiner. Arten foretrekker bare stammer uten slyngplanter og er vanlig i forstyrret, kystnært landskap, ofte i palmeplantasjer.

Klimaet er tropisk med varme, fuktige døgn. Om dagen soler dyret seg på lyse stammer og greiner og holder en kroppstemperatur på omtrent 30 °C mens det jakter insekter i løv og på bark. Fôret er mest leddyr, av og til små gekkoer og skinker, og litt frukt.

Stell

TERRARIET

Et enkelt voksent *Lamprolepis smaragdina* trenger et terrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre, særlig i høyden. Arten er trelevende, så høyden er viktigere enn gulvarealet. Et terrarium med frontåpning som er ugjennomsiktig på alle sider unntatt fronten, er roligere for dyret og lettere å komme til. Ventilasjonen må være god, slik at luften ikke blir stillestående og muggen.

Bunnen skal først og fremst holde på fuktigheten og dempe et fall. Bruk et lag på 5-10 cm fuktig kokosfiber eller sphagnum, evt. med et lag blader oppå, og skift bunnen helt minst en gang i måneden hvis den ikke er bioaktiv. En bioaktiv bunn krever et tykkere lag og levende planter.

Innred terrariet med mange greiner, kork og lianer i alle høyder, slik at dyret kan klatre og regulere temperaturen. En kraftig gren under varmekilden er solplass. Giftfrie tropiske planter som pothos, philodendron og bromelier gir dekning og hjelper på luftfuktigheten. Hanner og hunner skal bare holdes sammen hvis det skal yngles.

Les mer: Varme og temperatur Les mer: Terrarieoppsett og bioaktiv bunn

TEMPERATUR

Solplassen for *Lamprolepis smaragdina* skal være omtrent 35 °C, målt på selve greinen med en digital følerprobe. Den kjølige siden skal være 24-29 °C, og om natten skal temperaturen være 20-25 °C. Varmekilden slås av om natten. Den varmeste sonen er øverst under lampen, og den kjøligste nederst, så det må være klatremateriale i alle høyder.

En halogenlampe eller en varmepære på 60 W i en lampe med keramisk fatning er normalt nok til ett dyr; en dimmer eller termostat holder solplassen på riktig nivå. Er solplassen for varm, bytt til en svakere pære, og er den for kald, kreves en sterkere. Keramiske varmeelementer og fargede pærer er mindre egnet, fordi en dagaktiv skink trenger lys og strålevarme.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten i terrariet til *Lamprolepis smaragdina* skal være omtrent 70 % om dagen og stige mot 100 % om natten. Sprøyt terrariet morgen og kveld, helst når det er mørkt, og gjerne lett igjen om ettermiddagen. Et automatisk regnanlegg gjør det mye lettere i et så høyt terrarium, og dyret drikker dråpene som sitter på blader og greiner.

Mål med en digital hygrometerprobe midt i terrariet. For lav fuktighet gir helseproblemer, men det gjør også for dårlig ventilasjon, så terrariet må kunne tørke litt opp mellom sprøytingene. Brukes en forstøver, skal den kjøre med destillert vann og bare om natten og rengjøres jevnlig. Sett dessuten en lav skål med rent vann ved fôringsstedet. Skift vannet daglig, og skrubb skålen hver uke.

Les mer: Luftfuktighet, sprøyting og ventilasjon

LYS OG UVB

Lamprolepis smaragdina er dagaktiv og lever i solbeskinte trær, så arten trenger kraftig UVB og sterkt lys. Bruk et T5-rør på 6 % (Ferguson-sone 2) i et reflekterende armatur som dekker mesteparten av terrariets lengde, og sett solplassen 20-30 cm under røret. Til lave terrarier er et kompakt rør tett på solplassen å foretrekke. UV-indeksen skal være 2-3 på solplassen. Mål med en UV-måler, og skift røret hver 12. måned.

UVB blokkeres av glass og plast, så et vindu gir ingen UVB. Tilfør et kraftig hvitt lys på omtrent 6500 K, for eksempel et T5 HO-rør eller en LED-list, særlig hvis det er levende planter. Lyset skal være på 11-13 timer i døgnet og følge årstiden.

Les mer: Lys og UVB

FÔRING

Lamprolepis smaragdina er først og fremst insektetende, men tar litt frukt og blomster. Grunnfôret kan være sirisser, kakerlakker (for eksempel *Blaptica dubia*), gresshopper og andre varierte insekter. Et lite fat med fruktfôr til trelevende gekkoer kan tilbys en gang i uken. Variasjon er viktig.

Unge dyr fôres hver dag, voksne annenhver dag. Gi så mange insekter som dyret spiser på fem minutter, gjerne fra en pinsett med myke spisser. Byttedyrene må høyst være litt mindre enn dyrets hode. Fôr byttedyrene opp med næringsrikt fôr i to-tre dager før. Dryss dem lett med en blanding av kalsium og multivitamin ved hver fôring. Drikkevann får dyret fra sprøytingen, men en skål med rent vann skal alltid stå fremme.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

ATFERD OG HÅNDTERING

Lamprolepis smaragdina er rask og sky og bedre som utstillingsdyr enn som dyr til håndtering. Et nytt dyr må få minst to uker i fred. Spiser det ikke etter den tiden, bør det til dyrlege før det håndteres. Venn det til å ta insekter fra en pinsett, og la det selv gå opp på en hånd eller arm hvis det skal flyttes. Ta aldri tak ovenfra, for det oppfattes som et rovdyrangrep, og dyret kan kaste av halen.

Arten kan holdes enkeltvis eller i grupper i et tilsvarende større terrarium. Hanner er territorielle og skal ikke holdes sammen med andre hanner. Har ikke dyrene plass nok til å gå av veien for hverandre, blir det konflikter.

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Lamprolepis smaragdina blir kjønnsmoden etter 9-13 måneder. Kjønnsforskjellene er små: hannene er territorielle og kan kjennes på atferden, og en moden hann er som regel kraftigere bygd enn hunnen. Sikker kjønnsbestemmelse krever en dyrlege med erfaring i krypdyr.

PARRING

Avl av *Lamprolepis smaragdina* i terrarier er bare sparsomt beskrevet. En hann og en eller flere hunner holdes sammen i et stort, høyt terrarium med mange skjul og klatremuligheter, slik at hunnene kan gå av veien for hannen. Hannen nikker med hodet under frieriet. Hold hannene adskilt, siden de forsvarer territorium.

EGGLEGGING OG KULL

Lamprolepis smaragdina legger egg, normalt 1-2 om gangen. Hunnen legger dem under løs bark, så terrariet må ha løse korkflater og en eggleggingskasse med fuktig, løs jord eller mose. Hvor mange leggerunder hunnen har i året, er ikke dokumentert. Følg med på vekten til hunnen og kalsiuminntaket i eggleggingsperioden.

INKUBASJON

Eggene klekkes etter 69-100 dager. Ta dem forsiktig ut, uten å vende dem, og legg dem halvt nedgravd i fuktig vermikulitt eller torvmose i en lett ventilert beholder. Temperaturen er ikke dokumentert for arten; 26-29 °C passer for tropiske, trelevende skinker og er et anslag. Mosen skal være fuktig, men ikke våt.

OPPDRETT AV UNGER

Ungene ligner de voksne i fargen og fôres som voksne, men i mindre størrelse og hver dag. Gi små sirisser, spretthaler og andre små insekter, og dryss fôret med kalsium og D3-vitamin. Hold ungene i et lite, høyt terrarium med samme temperatur og fuktighet og UVB som de voksne. Hold dem adskilt fra voksne dyr hvis det ikke er plass nok.

Helse og vanlige feil

Det finnes bare lite spesifikk kunnskap om sykdommer hos arten. Typiske problemer og forebygging:

- Beinskjørhet og svakhet ved mangel på UVB, kalsium og D3-vitamin. Bruk kraftig UVB, skift røret hver 12. måned, og dryss fôret med kalsium og multivitamin.
- Luftveisproblemer og hudproblemer ved stillestående, for fuktig luft uten ventilasjon. Sørg for god ventilasjon og et tørt tidsrom mellom sprøytingene.
- Uttørking ved for lav luftfuktighet. Matte øyne og slapp kropp er tegn på for lite fuktighet.
- Parasitter hos nyinnkjøpte dyr, særlig viltfangede. Hold nye dyr i karantene og få en avføringsprøve undersøkt hos en dyrlege med erfaring i krypdyr.
- Tapt hale ved forskrekkelse eller feil håndtering. Halen vokser bare delvis tilbake.

Et friskt dyr er årvåkent, har klare øyne og en fast, avrundet kropp. Oppsøk dyrlege hvis dyret går ned i vekt, ikke spiser eller ligger sløvt.

Les mer: Karantene og hygiene Les mer: Kjøp av dyr: oppdrett, viltfangst og transport

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.