herpy

SKINKER

Tiliqua multifasciata

En kraftig skink fra det tørre indre av Australia med en bred, lysegrå til lysebrun kropp og tallrike oransjebrune tverrbånd fra nakken til halespissen. *Tiliqua multifasciata* har et stort hode, en svart stripe bak øyet og en blå tunge, og den krever et stort, tørt terrarium med varme og UVB.

Familie: Scincidae Engelsk: Centralian Blue-Tongued Lizard Tidligere navn: *Tiliqua occipitalis multifasciata* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**40-45 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**150 × 60 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Varmeplass	**37-40 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**2-10 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**90-120 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tiliqua multifasciata*.
TEMPERATUR	Terrariet må ha en tydelig gradient. Solplassen under en spotlampe skal ha en overflatetemperatur på 37-40 °C, og den kjølige enden skal holdes på 21-29 °C. Om natten slås lyset av, og temperaturen kan falle til 18-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Arten kommer fra tørre områder og trives ved en luftfuktighet på 20-40 %. Hold bunnen tørr og ventilasjonen god, for vedvarende fukt i bunnen kan gi soppinfeksjoner på buk og føtter.
LYS OG UVB	Arten lever i sterkt sollys, så terrariet må ha kraftig lys og UVB 8-12 timer om dagen. Gi UVB tilsvarende Ferguson-sone 3 med en UV-indeks på omkring 3 på solplassen.
FÔRING	*Tiliqua multifasciata* er altetende og spiser i naturen en stor andel plantekost: frø og plantedeler, men også insekter og åtsler. I fangenskap må kosten være allsidig.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er rolig og stedbundet og venner seg til forsiktig håndtering, men er ikke et dyr som skal bæres rundt. Et truet dyr freser med åpen munn og viser den blå tungen. Løft alltid under buken, og støtt hele kroppen.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.