herpy

SKINKER

Tiliqua nigrolutea

Tiliqua nigrolutea er en kraftig, tungbygd skink fra det sørøstlige Australia med bred blå tunge og lyse, uregelmessige flekker på mørk rygg. Den er dagaktiv og altetende, blir 35-50 cm lang og kan leve mange år. Arten kommer fra et kjølig temperert klima med en tydelig vinterdvale og må ha et stort terrarium, UVB og nattsenkning.

Familie: Scincidae Engelsk: Blotched Blue-Tongued Lizard Tidligere navn: *Scincus nigroluteus; Cyclodus nigroluteus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**35-55 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-30 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Varmeplass	**37-40 °C**
Temperatur, natt	**18-24 °C**
Luftfuktighet	**40-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt, planter og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**5-11 unger**
Drektighet	**90-150 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr må ha et terrarium på minst 180 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), tilsvarende godt 1 m² gulvareal. Større er bedre.

TEMPERATUR
Lufttemperaturen skal ligge på 21-29 °C fra den kjølige til den varme enden, og overflaten på solplassen skal være 37-40 °C, slik at dyret kan holde kroppen på de 30-35 °C det foretrekker når det er aktivt.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal være 40-50 %, målt i den kjølige enden. En våt bunn er ikke nødvendig, men et skjul med fuktig sphagnum, der fuktigheten kommer opp mot 100 %, hjelper på hudskiftet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og må ha både UVB og kraftig lys. Bruk et T5-rør med UVB, og plasser det slik at UV-indeksen på solplassen er omkring 3-4 (Ferguson-sone 3).

FÔRING
Tiliqua nigrolutea er altetende. Grunnfôret er en blanding av grønt, animalsk protein og litt frukt. Unger under 12 måneder skal ha 70-80 % protein, voksne omkring 50-60 %.

ATFERD OG HÅNDTERING
Tiliqua nigrolutea er rolig, og dyr fra oppdrett blir ofte tamme. Når du løfter dyret, skal hele kroppen inkludert halen hvile på underarmen, og den ene hånden skal være synlig.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/skinker/tiliqua-nigrolutea