herpy

SKINKER

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis er en kraftig, bakkelevende skink fra det sørlige og sentrale Australia med brune tverrbånd over kropp og hale og den brede, blå tungen som kjennetegner slekten. Arten blir omtrent 40 cm lang, er dagaktiv og altetende og må ha et stort terrarium med UVB og en varm solplass. Den får levende unger og sees sjelden i fangenskap.

Familie: Scincidae Engelsk: Western Blue-Tongued Lizard Tidligere navn: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**35-45 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-32 °C**
Varmeplass	**35-45 °C**
Temperatur, natt	**15-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt, planter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**5 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**90-120 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr må ha et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Det minste målet som oppgis for arten, er 100 × 50 cm til ett enkelt dyr, men det er trangt, og større er bedre.

TEMPERATUR
Gi dyret en temperaturgradient fra 22-26 °C i den kjølige enden til 28-32 °C i den varme enden. Overflaten på solplassen skal være 35-45 °C, og dyret må kunne velge hvor varmt det vil ligge.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Arten kommer fra tørre til halvtørre områder og skal ikke ha høy luftfuktighet. 30-50 % er passende, målt i den kjølige enden. Bunnen skal være lett fuktig dypere nede, men aldri våt.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og må ha både UVB og kraftig lys. Bruk et T5-rør med UVB over nettet, og plasser det slik at UV-indeksen på solplassen er 3-4 (Ferguson-sone 3).

FÔRING
Tiliqua occipitalis er altetende, og føden må varieres så mye som mulig. Grønt er for eksempel løvetann, hibiskusblomster, tusenfryd, kål og revet squash, og frukt gis i mindre mengder, både bløt og hard.

ATFERD OG HÅNDTERING
Skinken er sky de første dagene, men venner seg til og tåler rolig håndtering. Løft den med hele kroppen støttet slik at føttene har noe å stå på, hold den aldri med buken opp, og ta aldri tak i hodet eller halen.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.