herpy

SKINKER

Tribolonotus blanchardi

Tribolonotus blanchardi er en svært liten skink fra skogene på Salomonøyene og Bougainville. Den måler bare 3-4 cm fra snute til kloakk, lever skjult i det fuktige løvet langs små skogsbekker og legger ett egg om gangen. Det finnes bare lite kunnskap om arten og stellet av den.

Familie: Scincidae Engelsk: Blanchard's Helmet Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**65-85 dager** ved 23-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tribolonotus blanchardi*.
TEMPERATUR	*Tribolonotus blanchardi* bruker ikke solplasser. Hold 24-26 °C om dagen uten solplass og 20-22 °C om natten. Natten kan gjerne være litt kjøligere enn for *Tribolonotus gracilis*, fordi arten også lever i fjellskog.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	*Tribolonotus blanchardi* tåler uttørking svært dårlig. Luftfuktigheten må være høy, 80-90 %, og bunnen må alltid være fuktig. Sprøyt morgen og kveld, eller bruk et automatisk regnanlegg.
LYS OG UVB	*Tribolonotus blanchardi* lever skjult i løvet i skyggefull skog.
FÔRING	*Tribolonotus blanchardi* spiser insekter. Gi små byttedyr: små sirisser, bananfluer, spretthaler, små kakerlakker og små meitemark.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Tribolonotus blanchardi* er sky og tilbringer mesteparten av tiden skjult. Den er et dyr å se på og ikke til håndtering. Gi et nytt dyr minst to uker i fred.
NATURLIG UTBREDELSE	Salomonøyene og Papua Ny-Guinea.