herpy

SKINKER

Tribolonotus blanchardi

Tribolonotus blanchardi er en svært liten skink fra skogene på Salomonøyene og Bougainville. Den måler bare 3-4 cm fra snute til kloakk, lever skjult i det fuktige løvet langs små skogsbekker og legger ett egg om gangen. Det finnes bare lite kunnskap om arten og stellet av den.

Familie: Scincidae Engelsk: Blanchard's Helmet Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**65-85 dager** ved 23-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Tribolonotus blanchardi hører til slekten *Tribolonotus*, hvis arter har kjølede, ofte spisse skjell og et kantet, hjelmlignende hode. Den er en av de minste artene i slekten: voksne dyr måler høyst omtrent 4 cm fra snute til kloakk, og hunnene i gjennomsnitt godt 3 cm. Den samlede lengden med hale er ikke dokumentert, så størrelsen i boksen er snute-kloakk-lengden. Farger og tegning er ikke beskrevet nærmere.

Arten ble beskrevet i 1930 av Charles Burt ut fra et dyr fra Choiseul og er oppkalt etter den amerikanske biologen Frank Nelson Blanchard (1888-1937).

Som slektens øvrige arter er den sky og tilbringer mesteparten av tiden under dekke i løvet eller nede i bunnen. Arten holdes neppe i fangenskap, og stellet bygger derfor på de nærmeste slektningene, særlig *Tribolonotus gracilis*.

Utbredelse og leveområde

Tribolonotus blanchardi lever bare i øygruppen Salomonøyene: på Choiseul, Guadalcanal og Nggela-øyene, som hører til staten Salomonøyene, og på Bougainville, som hører til Papua Ny-Guinea. Typelokaliteten er Choiseul. Hele utbredelsen dekker omtrent 8.500 km².

Naturlig utbredelse: Salomonøyene og Papua Ny-Guinea.

LEVEOMRÅDE

Tribolonotus blanchardi lever i fuktig tropisk skog. Høyden oppgis forskjellig, fra omtrent 100 m og opp til 1.000-1.500 m, så arten finnes både i lavlandsskog og i fjellskog. Den lever i løvlaget og graver i bunnen, gjerne langs små skogsbekker, der den gjemmer seg under steiner, nedfalne stammer og blader. Føden er insekter.

Klimaet er varmt og svært fuktig hele året, men kjøligere i fjellene, særlig om natten. Arten oppgis som dagaktiv, men lever så skjult at den sjelden sees.

Stell

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tribolonotus blanchardi*. Den lever i fuktig skog på Salomonøyene, i løvet langs skogsbekker, og har samme krav som *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*, som er langt bedre kjent i fangenskap. Tallene i boksen er lånt fra *Tribolonotus gracilis* og tilpasset den mindre størrelsen.

Et enkelt dyr må ha et terrarium på minst 45 × 30 × 30 cm, og et par trenger mer plass. Mange skjul gjør at dyrene viser seg oftere, og et terrarium med frontåpning er roligere enn et som åpnes ovenfra.

Bunnen er det viktigste. Bruk en fuktholdig, jordaktig bunn av matjord og kokosfiber i et lag på 5-10 cm med et tykt lag nedfalne blader oppå. Et dreneringslag av leirkuler nederst og langfibret sphagnum over det holder bunnen jevnt fuktig uten å bli sur. Fjern ekskrementer daglig, og skift bunnen helt hver 3.-4. måned.

Innred med flere skjul, for eksempel kokosskall, korkrør og korkbark, slik at dyret selv kan velge hvor det vil være. Giftfrie planter og grener gir ekstra dekning. Terrariet må ha god ventilasjon, slik at overflaten kan tørke litt opp mellom sprøytingene.

TEMPERATUR

Tribolonotus blanchardi bruker ikke solplasser. Hold 24-26 °C om dagen uten solplass og 20-22 °C om natten. Natten kan gjerne være litt kjøligere enn for *Tribolonotus gracilis*, fordi arten også lever i fjellskog. Romtemperatur er ofte nok, og en svak varmekilde over et skjul i den ene enden kan hjelpe hvis rommet er kjølig. Unngå varmepærer som tørker ut terrariet, og la aldri bunnen bli varm og tørr. Mål temperaturen i skjulet med en digital føler.

Les mer: Varme og temperatur

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Tribolonotus blanchardi tåler uttørking svært dårlig. Luftfuktigheten må være høy, 80-90 %, og bunnen må alltid være fuktig. Sprøyt morgen og kveld, eller bruk et automatisk regnanlegg. Sørg for god ventilasjon, slik at luften ikke blir stillestående og muggen. Bruk destillert vann eller vann fra omvendt osmose i en eventuell forstøver.

Sett en liten, lav skål med rent vann, gravd delvis ned i bunnen, slik at dyret kan drikke og bade. Skift vannet daglig, og skrubb skålen hver uke.

Les mer: Luftfuktighet, sprøyting og ventilasjon

LYS OG UVB

Tribolonotus blanchardi lever skjult i løvet i skyggefull skog. Et svakt UVB-lys for skogsarter som lever i skygge (Ferguson-sone 1), med en UV-indeks på 1-2 på det høyeste stedet under lampen, anbefales som for *Tribolonotus gracilis*. Det må være masse skygge og skjul, slik at dyret selv kan velge. Hold lyset på omtrent 12 timer i døgnet, slik at dag og natt holdes adskilt, og bruk hvitt lys.

Les mer: Lys og UVB

FÔRING

Tribolonotus blanchardi spiser insekter. Gi små byttedyr: små sirisser, bananfluer, spretthaler, små kakerlakker og små meitemark. Byttedyrene må høyst være like brede som avstanden mellom dyrets øyne, og et dyr på 3-4 cm krever svært små fôrdyr. Gi føde hver dag eller annenhver dag, og dryss insektene med kalk og D3-vitamin. En skål med friskt vann må alltid stå framme.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

ATFERD OG HÅNDTERING

Tribolonotus blanchardi er sky og tilbringer mesteparten av tiden skjult. Den er et dyr å se på og ikke til håndtering. Gi et nytt dyr minst to uker i fred. Hos *Tribolonotus gracilis* er hannene aggressive mot hverandre, så dyrene holdes enkeltvis eller som et par i et romslig terrarium, aldri to hanner sammen.

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Kjønnsforskjeller og alder ved kjønnsmodning er ikke dokumentert for *Tribolonotus blanchardi*. Hos *Tribolonotus gracilis* kjennes hannen på et felt av forstørrede bukskjell og porer under tærne på bakføttene; om det også gjelder denne arten, er ikke kjent.

PARRING

Paringen er ikke dokumentert for *Tribolonotus blanchardi*. Hos *Tribolonotus gracilis* kan paring fremmes året rundt med hyppig sprøyting og høyere luftfuktighet. Et par må ha rikelig med skjul, slik at dyrene kan holde seg unna hverandre.

EGGLEGGING OG KULL

Hunnen av *Tribolonotus blanchardi* legger ett egg om gangen. Antallet egg i året er ikke dokumentert. Hos *Tribolonotus gracilis* graves egget ned rett under overflaten i et skjul, og hunnen blir hos det. Gi en fordypning i bunnen under et skjul, fylt med lett fuktig sphagnum og matjord og dekket av korkbark.

INKUBASJON

Rugingen er ikke dokumentert for *Tribolonotus blanchardi*. Tallene i boksen er lånt fra *Tribolonotus gracilis*, der egget klekkes etter 65-85 dager ved 23-27 °C. Legg egget halvt nedgravd i fuktig sphagnum i en lett ventilert beholder uten å vende det. Mosen må være fuktig, men ikke våt.

OPPDRETT AV UNGER

Oppdrett er ikke dokumentert for *Tribolonotus blanchardi*. Hos *Tribolonotus gracilis* leter ungene etter føde og skjul få timer etter klekkingen. Gi dem et lite terrarium med fuktig kjøkkenpapir eller mose, et kokosskall som skjul og en svært lav vannskål, og gi daglig de minste byttedyrene drysset med kalk og D3.

Helse og vanlige feil

Sykdommer hos *Tribolonotus blanchardi* er ikke beskrevet. Hos slektens arter er dette de typiske problemene:

- Parasitter og bakterieinfeksjoner hos viltfangede dyr. Hold nye dyr i karantene enkeltvis, og la veterinæren undersøke en avføringsprøve.
- Uttørking. Matte øyne og en slapp kropp er tegn på sykdom eller for lite fukt.
- Beinskjørhet ved for lite kalk og D3-vitamin.
- Mistet hale ved forskrekkelse eller håndtering.

Søk veterinær med erfaring med krypdyr hvis dyret taper seg, ikke spiser eller ligger sløvt.

Les mer: Karantene og hygiene Les mer: Kjøp av dyr: oppdrett, viltfangst og transport

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.