herpy

SKINKER

Tribolonotus gracilis

Tribolonotus gracilis er en sky, skumringsaktiv skink fra regnskogen på det nordlige Ny-Guinea med en rødoransje ring rundt øynene og rekker av spisse, bakoverbøyde skjell nedover ryggen, som gir den et pansret, nesten drakelignende utseende. Den lever skjult i fuktig skogsbunn, kan gi fra seg lyd og legger bare ett egg om gangen. Den egner seg best som utstillingsdyr, ikke til håndtering.

Familie: Scincidae Engelsk: Red-Eyed Bush Crocodile Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36-48 mnd.**
Kullstørrelse	**1 egg**
Kull per år	**1-6**
Inkubasjon	**65-85 dager** ved 23-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Vedlegg D**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et enkelt dyr må ha et terrarium på minst 60 × 45 × 45 cm, og større er bedre. Et par må ha minst 0,3 m² bunn, for eksempel 90 × 45 cm.

TEMPERATUR

Tribolonotus gracilis er tropisk, men soler seg ikke i naturen. Hold terrariet på 24-26 °C i den kjølige enden og 27-28 °C i et varmt skjul, og la temperaturen falle til 22-24 °C om natten.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten tåler uttørking svært dårlig. Luftfuktigheten må være 70-80 % om dagen og høyere om natten, gjerne omtrent 90 %, og bunnen må alltid være fuktig.

LYS OG UVB

Arten er aktiv i skumringen og om natten, og oppgavene om UVB er uenige. Dyret kan klare seg og formere seg uten UVB når fôret får kalk og D3-vitamin, men et svakt UVB-lys gir de beste resultatene og anbefales.

FÔRING

Arten er insektspiser. Grunnfôret kan være sirisser, kakerlakker (for eksempel *Blaptica dubia* og *Blaberus discoidalis*), melorm, superormer, tobakksvermerlarver, silkeormer, larver av soldatfluen, meitemark og snegler.

ATFERD OG HÅNDTERING

Tribolonotus gracilis er et dyr å se på og ikke til håndtering. Når den blir grepet, hviner den, later som den er død, prøver å flykte eller kaster halen, og det stresser den.

NATURLIG UTBREDELSE

Papua Ny-Guinea og Indonesia.