herpy

SKINKER

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae er en liten, sky skink fra lavlandsregnskogen på Ny-Guinea med rekker av spisse, bakoverbøyde skjell nedover ryggen. Den lever skjult i fuktig skogsbunn, er mest aktiv i skumringen og legger bare ett egg om gangen. Det finnes bare lite kunnskap om stellet av akkurat denne arten, og den egner seg best som utstillingsdyr.

Familie: Scincidae Engelsk: Spiny Skink Tidligere navn: *Zonurus novaeguineae* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**16-20 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36-48 mnd.**
Kullstørrelse	**1 egg**
Kull per år	**1-6**
Inkubasjon	**65-85 dager** ved 23-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Vedlegg D**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tribolonotus novaeguineae*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 24-27 °C, og et varmt skjul med 27-28 °C holder dyret i gang, selv om det ikke soler seg. Om natten er 22-24 °C passende. Bruk en liten varmelampe i keramisk fatning over skjulet, styrt av en termostat.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være 70-90 %, høyest om natten, og bunnen må alltid være fuktig. Sprøyt terrariet morgen og kveld med rent vann (omvendt osmose eller destillert), og hev fuktigheten til 85-90 % hvis dyrene skal formere seg.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og skal ikke ha en kraftig solplass, men 12 timers dagslys i døgnet holder døgnrytmen.
FÔRING	*Tribolonotus novaeguineae* er insektspiser. Grunnfôret er sirisser, kakerlakker, meitemark, melorm og silkeormer, og voksmøllarver og superormer gis i mindre mengder. En levende meitemark lagt ved skjulet får som regel dyret fram.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Tribolonotus novaeguineae* er et dyr å se på og ikke til håndtering. Når den blir grepet, kan den gi fra seg lyd, late som den er død, prøve å flykte eller kaste halen, og det stresser den.
NATURLIG UTBREDELSE	Indonesia og Papua Ny-Guinea.