herpy

SKINKER

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti er en sjelden, skjult levende skink fra øyene i Salomonøyene og den største arten i sin slekt. Den har kjølede, tornete skjell og et kantet, pansret hode, lever i skogbunnen og graver seg ned, og den kan gi fra seg lyd. Stellet bygger på klimaet og på de nære slektningene *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*.

Familie: Scincidae Engelsk: Giant Spiny Skink Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**11-13 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**75 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**65-85 dager** ved 23-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Datamangel (DD)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare svært lite kunnskap om stell av *Tribolonotus ponceleti*. Klimaet i utbredelsesområdet er varmt og fuktig hele året, og arten lever i skogbunnens løv.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 24-27 °C i den kjølige enden og 27-28 °C i et varmt skjul, og la temperaturen falle til 22-24 °C om natten. Skinken er aktiv i skumringen og om natten og soler seg neppe, men varmer seg i skjul.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 70-80 % om dagen og høyere om natten, gjerne 80-90 %, og bunnen må alltid være fuktig. Arten tåler formodentlig uttørking svært dårlig, som de nære slektningene.

LYS OG UVB

Dyret er aktivt i skumringen og om natten, og behovet for UVB er ikke dokumentert. Hos de nære slektningene kan dyrene klare seg uten UVB når fôret får kalk og D3-vitamin, men et svakt UVB-lys anbefales.

FÔRING

Arten spiser leddyr i naturen. Grunnfôret kan være sirisser, kakerlakker, melorm, silkeormer, larver av soldatfluen, meitemark og snegler. Variasjon er viktig, og meitemark får som regel et skjult dyr fram.

ATFERD OG HÅNDTERING

Tribolonotus ponceleti er et dyr å se på og ikke til håndtering. Skinker i slekten later som de er døde, prøver å flykte, kaster halen eller gir fra seg lyd når de blir grepet, og det stresser dem.

NATURLIG UTBREDELSE

Salomonøyene og Papua Ny-Guinea.