herpy

SKINKER

False Poncelet's Helmet Skink

Tribolonotus pseudoponceleti

Tribolonotus pseudoponceleti er en liten, hemmelighetsfull skink fra Bougainville og Buka i den nordlige delen av Salomonøyene. Den har kjølede, rue skjell og et trekantet hode og lever under råtnende stammer, som regel i par. Stellet er nesten ikke beskrevet og bygger derfor på artens levesett i naturen og på de nære slektningene *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*.

Familie: Scincidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-7 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**65-85 dager** ved 23-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Stellet av *Tribolonotus pseudoponceleti* er nesten ikke beskrevet. Arten lever i et varmt og fuktig klima og skjuler seg under råtnende stammer.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 24-27 °C i den kjølige enden og 27-28 °C i et varmt skjul, og om natten 22-24 °C. Arten viser seg ikke i det åpne og soler seg ikke, men varmer seg under stammer og bark.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være 70-80 % om dagen og 80-90 % om natten, og bunnen skal alltid være fuktig, men ikke bløtvåt; arten foretrekker fuktige, men ikke vannmettede steder.
LYS OG UVB	Behovet for UVB er ikke dokumentert. De nære slektningene kan klare seg uten UVB når fôret får kalk og D3-vitamin, men et svakt UVB-lys anbefales.
FÔRING	Arten spiser små leddyr, i fangenskap også termitter. Grunnfôret kan være små sirisser, kakerlakker, melorm, silkeormer, larver av soldatflue, meitemark og små snegler. Variasjon er viktig.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Tribolonotus pseudoponceleti* er et dyr å se på og ikke å håndtere. Blir den avdekket, trykker den seg flatt mot bakken og blir liggende eller kryper sakte bort; den prøver sjelden å flykte.
NATURLIG UTBREDELSE	Papua Ny-Guinea.