herpy

SKINKER

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti er en liten, sky skink fra Guadalcanal på Salomonøyene med to rader plateformede skjell nedover ryggen. Den lever skjult i det fuktige løvlaget på skogbunnen og føder levende unger, én om gangen, i motsetning til de to bedre kjente slektningene, som legger egg.

Familie: Scincidae Engelsk: Schmidt's Crocodile Skink Tidligere navn: *Pediporus schmidti* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**1 unger**
Drektighet	**65-85 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tribolonotus schmidti*. Arten lever i varm, fuktig skog på Guadalcanal og må antas å ha de samme kravene som de nære slektningene *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*.

TEMPERATUR

Hold terrariet til *Tribolonotus schmidti* på 24-27 °C om dagen, med et varmt skjul på 27-28 °C, og la temperaturen falle til 22-24 °C om natten.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

For *Tribolonotus schmidti* skal luftfuktigheten være 70-90 %, og bunnsubstratet skal alltid være fuktig.

LYS OG UVB

Tribolonotus schmidti sover om natten og er trolig aktiv om dagen og i skumringen i det skyggefulle løvlaget. UVB er ikke dokumentert for arten, men et svakt UVB-lys (Ferguson-sone 1) anbefales etter slektningene.

FÔRING

Tribolonotus schmidti er insektetende. Grunnfôret kan være sirisser, kakerlakker, melorm, små larver og meitemark. Snegler og ormer kan tilbys som variasjon. Unge dyr fôres hver dag, voksne annenhver dag.

ATFERD OG HÅNDTERING

Tribolonotus schmidti er en sky skink som lever skjult, og som er et dyr å se på, ikke å håndtere. Slekten kan gi fra seg lyder, men det er ikke dokumentert for arten. Gi et nytt dyr minst to uker i fred.

NATURLIG UTBREDELSE

Salomonøyene.