herpy

SKINKER

Tribolonotus schmidti

Tribolonotus schmidti er en liten, sky skink fra Guadalcanal på Salomonøyene med to rader plateformede skjell nedover ryggen. Den lever skjult i det fuktige løvlaget på skogbunnen og føder levende unger, én om gangen, i motsetning til de to bedre kjente slektningene, som legger egg.

Familie: Scincidae Engelsk: Schmidt's Crocodile Skink Tidligere navn: *Pediporus schmidti* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**9-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**1 unger**
Drektighet	**65-85 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Tribolonotus schmidti er en liten, kraftig bygd skink med trekantet hode og korte bein. Midt nedover ryggen går det to rader med forstørrede, plateformede skjell, med over 20 skjell i hver rad fra nakken til halen, og de gir den et pansret, dragelignende utseende. Slekten har spesielle porer under føttene. Farger og tegninger er ikke beskrevet i detalj for arten.

Kroppen fra snute til kloakk er opptil 4 cm, og typeeksemplaret måler knapt 9 cm inkludert hale. Voksne dyr er altså omkring 9-10 cm lange, og arten er en av de minste i slekten.

Arten ble beskrevet i 1930 av Charles Burt og er oppkalt etter herpetologen Karl Patterson Schmidt. Den skiller seg fra de bedre kjente slektningene ved å føde levende unger.

Utbredelse og leveområde

Tribolonotus schmidti lever bare på Guadalcanal, den største av Salomonøyene. Typelokaliteten er Marapa Island (tidligere Beagle Island) i Marau Sound i den østlige delen av øya. En eldre angivelse fra Bougainville er sannsynligvis en forveksling med en annen art i slekten.

Naturlig utbredelse: Salomonøyene.

LEVEOMRÅDE

Tribolonotus schmidti lever i skog på Guadalcanal fra havnivå og opp til omkring 1.500 m. Den lever skjult i løvlaget på skogbunnen under nedfalne blader, greiner og annet avfall, og den sover om natten. Klimaet er tropisk og fuktig hele året, kjøligere i fjellet enn ved kysten. Temperaturer og skjulesteder er ikke nærmere beskrevet for arten.

Stell

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Tribolonotus schmidti*. Arten lever i varm, fuktig skog på Guadalcanal og må antas å ha de samme kravene som de nære slektningene *Tribolonotus gracilis* og *Tribolonotus novaeguineae*. Tallene i veiledningen er lånt fra dem.

Et enkelt voksent dyr trenger et terrarium på minst 60 × 45 × 45 cm, og større er bedre. Bruk et dypt, fuktig bunnsubstrat av matjord og kokosfiber i et lag på 5-10 cm med et tykt lag nedfalne blader oppå. Innred med mange skjulesteder som kokosskall, korkrør og buede stykker korkbark, slik at dyret selv kan velge. Et terrarium med frontåpning er roligere enn et som åpnes ovenfra. Ventilasjonen må være god, slik at luften ikke blir stillestående og muggen. Fjern ekskrementer daglig, og skift bunnsubstratet helt hver 3.-4. måned.

TEMPERATUR

Hold terrariet til *Tribolonotus schmidti* på 24-27 °C om dagen, med et varmt skjul på 27-28 °C, og la temperaturen falle til 22-24 °C om natten. Arten lever i skygge og soler seg neppe, så varmen skal komme fra et skjul under en svak varmepære på 50-60 W med keramisk fatning i den ene enden. Blir skjulet for varmt, bytter du til en svakere pære. Mål temperaturen i skjulet med en digital føler, eller styr den med termostat. Er stuen kaldere enn 22 °C om natten, kan et keramisk varmeelement på termostat brukes.

Les mer: Varme og temperatur

LUFTFUKTIGHET OG VANN

For *Tribolonotus schmidti* skal luftfuktigheten være 70-90 %, og bunnsubstratet skal alltid være fuktig. Sprøyt terrariet morgen og kveld, eller bruk et automatisk regnanlegg, og sørg for god ventilasjon, slik at terrariet tørker litt opp mellom sprøytingene. Slekten tåler uttørking dårlig. Sett en skål med rent vann, gravd delvis ned i bunnsubstratet, til drikkevann og bad, og skift vannet daglig.

Les mer: Luftfuktighet, sprøyting og ventilasjon

LYS OG UVB

Tribolonotus schmidti sover om natten og er trolig aktiv om dagen og i skumringen i det skyggefulle løvlaget. UVB er ikke dokumentert for arten, men et svakt UVB-lys (Ferguson-sone 1) anbefales etter slektningene. Bruk et T5-rør for skogarter i skygge, og la det dekke halvparten av terrariets lengde. UV-indeksen skal være 1-2 på det høyeste stedet. Det må være mye skygge og mange skjulesteder. La lyset være på 12 timer i døgnet, slik at dag og natt holdes adskilt, og skift røret hver 12. måned.

Les mer: Lys og UVB

FÔRING

Tribolonotus schmidti er insektetende. Grunnfôret kan være sirisser, kakerlakker, melorm, små larver og meitemark. Snegler og ormer kan tilbys som variasjon. Unge dyr fôres hver dag, voksne annenhver dag. Byttedyrene må høyst være halvparten så store som dyrets hode. Dryss insektene med kalk ved hver fôring og med D3-vitamin og multivitamin ved hver andre. Det skal alltid stå en skål med friskt vann.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

ATFERD OG HÅNDTERING

Tribolonotus schmidti er en sky skink som lever skjult, og som er et dyr å se på, ikke å håndtere. Slekten kan gi fra seg lyder, men det er ikke dokumentert for arten. Gi et nytt dyr minst to uker i fred. Dyr av samme kjønn kan være aggressive mot hverandre, så arten holdes enkeltvis eller som et par i et romslig terrarium med mange skjulesteder.

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Kjønnsmodning og kjønnsforskjeller er ikke dokumentert for *Tribolonotus schmidti*. Hos slekten har hannene forstørrede skjell og porer under bakføttene, som kan sees med en lupe.

PARRING

Avl av *Tribolonotus schmidti* i terrarier er ikke dokumentert. Slektningene formerer seg når et par settes sammen i et romslig, fuktig terrarium med mange skjulesteder. Paret deler ofte skjul.

EGGLEGGING OG KULL

Tribolonotus schmidti føder levende unger, i motsetning til de bedre kjente slektningene, som legger egg. Eggene utvikles i hunnen, og det fødes én unge om gangen. Hvor mange kull hunnen får per år, er ikke dokumentert. Gi en drektig hunn mange skjulesteder og stabil fuktighet.

INKUBASJON

Det er ingen egg å ruge ut, fordi ungen fødes levende. Drektighetens lengde er ikke dokumentert for *Tribolonotus schmidti*. De 65-85 dagene i boksen tilsvarer eggenes utviklingstid hos *Tribolonotus gracilis* og er bare et grovt anslag.

OPPDRETT AV UNGER

Oppdrett er ikke dokumentert for arten. Ungene antas å ligne på de voksne og kan fôres som hos slektningene: små sirisser og andre små insekter hver dag, dryssede med kalk og D3-vitamin, i en lav boks med fuktig kjøkkenpapir eller mose, et kokosskall som skjul og en lav vannskål.

Helse og vanlige feil

Det er nesten ingenting kjent om sykdommer hos arten, og for slekten er kunnskapen begrenset. Typiske problemer og forebygging:

- Parasitter hos nyinnkjøpte, viltfangede dyr. Hold nye dyr i karantene enkeltvis, og få en avføringsprøve undersøkt hos en veterinær med erfaring med krypdyr.
- Bakterieinfeksjoner hos stressede dyr etter transport og kulde.
- Uttørking. Matte øyne og slapp kropp er tegn på for lite fuktighet.
- Beinskjørhet ved for lite kalk og D3-vitamin.
- Tapt hale ved skremsel eller håndtering.

Et sunt dyr er våkent, har klare, blanke øyne og ingen sår. Søk veterinær hvis dyret går ned i vekt, ikke spiser eller ligger slapt.

Les mer: Karantene og hygiene Les mer: Kjøp av dyr: oppdrett, viltfangst og transport

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.