herpy

SLANGER

Kongeboa

Boa constrictor

Boa constrictor er en kraftig boa fra Sør-Amerika, særlig øst for Andesfjellene, brun til grå med mørke salmerker og en hale som hos mange lokalformer er rødbrun til rød. Den blir 180-300 cm, er aktiv i skumringen og om natten og lever 20-30 år. Den er større enn den nært beslektede *Boa imperator*, krever et stort terrarium, sjeldne måltider og en holder som kan ta ansvar i flere tiår.

Familie: Boidae Engelsk: Boa Constrictor Tidligere navn: *Constrictor constrictor* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**180-300 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Savanne, tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**240 × 120 × 120 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**55-75 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**18-48 mnd.**
Kullstørrelse	**10-65 unger**
Drektighet	**100-120 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr over 240 cm trenger et terrarium på minst 240 × 120 × 120 cm (lengde × bredde × høyde), og mindre voksne dyr på 180-240 cm minst 180 × 90 × 90 cm.

TEMPERATUR
Det må være en gradient fra kald til varm. Luften ved solplassen skal være 30-32 °C og den kalde enden 24-26 °C, og hele terrariet bør romme soner mellom 24 og 32 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal ligge på 55-75 % og variere litt. Kortvarig over 70 % skader ikke hvis terrariet får tørke ut, mens vedvarende fuktighet gir skimmel. Før hudskifte kan 75-85 % hjelpe dyret med å skifte i ett stykke.

LYS OG UVB
Arten er nattaktiv og trenger ikke kraftig lys, men UVB anbefales. Den hører til Ferguson-sone 2: tilfeldig solbading. Målet er en UV-indeks på 2-3 ved solplassen.

FÔRING
B. constrictor er en kjøtteter og må ha hele byttedyr. Unge dyr får mus og små rotter, og voksne dyr får rotter, unge kaniner, marsvin, kyllinger og vaktler. Variasjon er sunt.

ATFERD OG HÅNDTERING
B. constrictor er en klok, individuell slange. Noen dyr tåler og liker håndtering, andre vil helst ha fred. Unger og unge dyr er ofte nervøse og kan hvese og bite. Konsekvent, mild håndtering gjør dem rolige.

NATURLIG UTBREDELSE
Colombia, Venezuela, Guyana, Fransk Guyana, Surinam, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina og Trinidad og Tobago.