herpy

SLANGER

African Brown House Snake

Boaedon fuliginosus

Boaedon fuliginosus er en liten, slank og nattlig slange fra Vest-Afrikas savanner, hvor den ofte lever tett på menneskers hus og spiser alt fra øgler til gnagere. Dyrene i handelen er robuste og blir som regel rolige som voksne, men de har en svært ivrig fôringsrefleks og er flinke rømningskunstnere.

Familie: Lamprophiidae Tidligere navn: *Lamprophis fuliginosus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**60-120 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-16 egg**
Kull per år	**1-4**
Inkubasjon	**55-65 dager** ved 29-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *B. fuliginosus* skal ha et terrarium på minst 90 × 45 × 40 cm. Større er alltid bedre, og store hunner trives i 100 × 50 × 40 cm.

TEMPERATUR

Terrariet skal ha en tydelig temperaturgradient. Om dagen er det 24-28 °C i terrariet, med omtrent 24 °C i den kjølige enden. Det varmeste stedet, hvor slangen kan ligge og varme seg, skal være 30-32 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 40-60 %. Det oppnås i de fleste stuer med en vannskål, og det er sjelden nødvendig å dusje.

LYS OG UVB

B. fuliginosus er nattlig og har ikke behov for sterkt lys. En fast lysrytme på omtrent 12 timer lys og 12 timer mørke året rundt gir en klar døgnrytme.

FÔRING

Boaedon fuliginosus kveler byttet sitt, har en kraftig fôringsrefleks og spiser nesten alltid. Den fôres med hele, tinte mus eller små rotter, aldri med levende byttedyr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Unger og halvvoksne kan være raske, bitske og urolige, og de kan sprette ut av terrariet som en utløst fjær når lokket åpnes. Åpne derfor lokket forsiktig over et trygt sted.

NATURLIG UTBREDELSE

Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Kamerun, Tsjad og Den sentralafrikanske republikk.