herpy

SLANGER

Eryx colubrinus

Eryx colubrinus er en liten, kraftig bygget boa fra Øst-Afrikas tørre områder, som tilbringer mesteparten av tiden nedgravd i sand med bare de oppovervendte øynene over overflaten. Den er rolig, krever ikke mye plass og kan bli 20-30 år gammel, så den er et godt valg for den som vil ha sin første slange.

Familie: Boidae Engelsk: Kenyan Sand Boa Tidligere navn: *Gongylophis colubrinus; Eryx thebaicus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**40-65 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Varmeplass	**33-35 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**10-20 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**120-180 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Eryx colubrinus* trenger et terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (lengde × bredde × høyde), gjerne 90 × 45 × 45 cm. Hunner som er større enn gjennomsnittet, trenger mer enn minimum.

TEMPERATUR

Eryx colubrinus tåler tørre, varme forhold. Det må være en varm og en kjølig ende. Overflaten under varmekilden skal være 33-35 °C, og den kjølige enden 26-28 °C. Om natten kan temperaturen falle til 22-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Eryx colubrinus lever i et tørt klima, og terrariet skal være tørt mesteparten av tiden. Luftfuktigheten ligger best omkring 20-40 %; tallet er et anslag ut fra levestedet. Et hygrometer viser om terrariet blir for fuktig.

LYS OG UVB

Eryx colubrinus er mest aktiv i skumringen og om natten og kan leve uten UVB, men et svakt UVB-rør anbefales, fordi det støtter døgnrytmen og dekker behovet for D3-vitamin.

FÔRING

Eryx colubrinus er kjøttetende og tar hele byttedyr. Grunnfôret er mus: voksne hunner kan ta en stor voksen mus, voksne hanner en stor hoppermus.

ATFERD OG HÅNDTERING

Eryx colubrinus er rolig og biter sjelden. La nye dyr venne seg til i to uker og begynn først håndtering når de spiser regelmessig.

NATURLIG UTBREDELSE

Egypt, Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Tanzania og Somalia.