herpy

SLANGER

Indian Sand Boa

Eryx johnii

Eryx johnii er en liten, kraftig bygd sandboa fra det tørre Sør-Asia. Den tilbringer mesteparten av tiden nedgravd i løs jord, ofte med den butte halen, som ligner et hode, som eneste synlige del. Den er rolig, biter sjelden og krever ikke mye plass, så den passer godt som første slange.

Familie: Boidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**50-90 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**4-14 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**120-180 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Eryx johnii* skal ha et terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (lengde × bredde × høyde). Arten bruker nesten ingen høyde, så gulvarealet er det som teller; en stor hunn skal ha et større terrarium.

TEMPERATUR

Eryx johnii trenger en varm og en kjølig ende. Sanden på den varme plassen skal være 32-35 °C og i den kjølige enden 24-28 °C. Luften i terrariet skal være 26-28 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Eryx johnii kommer fra tørre låglandsområder, og luftfuktigheten skal ligge omkring 40-50 %. Under hudskifte kan den være opptil 60 %. Et hygrometer viser om tallet holder.

LYS OG UVB

Eryx johnii er mest aktiv i skumringen og om natten, og UVB er ikke dokumentert som nødvendig for arten.

FÔRING

Eryx johnii tar hele byttedyr og er kjent for sin gode appetitt. Grunnfôret er mus; store voksne hunner kan ta små rotter. Ungene er store ved fødselen og kan starte med nyfødte rotter eller små museunger med dun.

ATFERD OG HÅNDTERING

Eryx johnii er rolig og forsøker sjelden å bite; når den er redd, slår den heller med kroppen uten å treffe. Biter den likevel, må hånden ikke rykkes til seg, for det kan skade slangen.

NATURLIG UTBREDELSE

Afghanistan, Pakistan, Iran, India og Nepal.