herpy

SLANGER

Lampropeltis californiae

Lampropeltis californiae er en glatt, blank kongeslange fra det vestlige Nord-Amerika, svart eller mørkebrun med hvite til lysegule tverrbånd eller én enkelt hvit ryggstripe. Den blir 75-120 cm, spiser gnagere og andre slanger og er robust og tåler håndtering godt. Den lever mer enn 20 år og stelles i et gulvterrarium med varmeplass og moderat luftfuktighet.

Familie: Colubridae Engelsk: California Kingsnake Tidligere navn: *Lampropeltis getula californiae* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**75-120 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**Om dagen, i skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-15 egg**
Inkubasjon	**60-70 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr trenger et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Større er bedre, for arten er aktiv og utforsker hele terrariet.

TEMPERATUR

Dyret regulerer temperaturen sin ved å flytte seg mellom varme og kalde steder, så terrariet må ha en tydelig gradient. Overflaten under varmelampen skal være 29-32 °C, målt med et infrarødt termometer, og den kalde enden 21-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 40-60 %, målt med et digitalt hygrometer midt i terrariet. Den er høyere i den kalde enden og om natten og lavere i den varme enden, og det er normalt.

LYS OG UVB

Arten hører til Ferguson-sone 2: den soler seg av og til og får litt sollys i naturen. Den kan klare seg uten UVB, men UVB anbefales for best velferd.

FÔRING

L. californiae er kjøttetende og må ha hele byttedyr. Den viktigste fôrkilden i fangenskap er mus, og når dyret vokser, brukes unge rotter.

ATFERD OG HÅNDTERING

L. californiae er robust og tolerant, og det er en av grunnene til at den er blant de mest holdte slangene. Gi et nytt dyr omtrent 2 uker i fred, og begynn først å håndtere det når det spiser regelmessig.

NATURLIG UTBREDELSE

USA og Mexico.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/slanger/lampropeltis-californiae