herpy

SLANGER

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki er en middelsstor til stor kongeslange fra det sentrale og sørlige USA, svart med en liten gulhvit flekk på nesten hver skjelle, slik at mønsteret ligner salt og pepper. Den blir 90-120 cm, spiser gnagere, øgler, frosker og andre slanger og er robust og lett å stelle. Den holdes enkeltvis i et gulvterrarium med varmeplass og moderat luftfuktighet og kan bli over 20 år.

Familie: Colubridae Engelsk: Speckled Kingsnake Tidligere navn: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-120 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-15 egg**
Inkubasjon	**60-70 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes lite artsspesifikk kunnskap om stell av *Lampropeltis holbrooki*. Tallene her er hentet fra kongeslanger generelt, særlig *Lampropeltis californiae* og *Lampropeltis getula*, som har de samme kravene.

TEMPERATUR

Dyret regulerer temperaturen sin ved å flytte seg mellom varme og kalde steder, så terrariet må ha en tydelig gradient. Overflaten under varmelampen skal være 29-32 °C, målt med et infrarødt termometer, og den kalde enden 21-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 40-60 %, målt med et digitalt hygrometer midt i terrariet. Den er høyere i den kalde enden og om natten og lavere i den varme enden, og det er normalt.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg i naturen. Den klarer seg uten UVB, men UVB anbefales for best mulig velferd. Det passer til Ferguson-sone 2.

FÔRING

L. holbrooki er kjøttetende og må ha hele byttedyr. Mus er standardfôr, og når dyret vokser, brukes unge rotter.

ATFERD OG HÅNDTERING

L. holbrooki er robust og tolerant. Gi et nytt dyr omtrent 2 uker i fred, og begynn først med håndtering når det spiser regelmessig. Begynn med korte økter på høyst 5 minutter, og løft dyret nedenfra, med støtte under kroppen.

NATURLIG UTBREDELSE

USA.