herpy

SLANGER

Mexican Kingsnake

Lampropeltis mexicana

Lampropeltis mexicana er en slank kongeslange fra høylandet i det sentrale Mexico med røde, svartkantede tverrbånd på grå eller brun bunn og et broket rødt mønster på hodet. Den blir 60-90 cm, er nattaktiv og tilbakeholden og må ha et tørt til lett fuktig terrarium med mange gjemmesteder og en kjølig vinterhvile. Tegningen minner om en korallslanges, men slangen er helt ufarlig.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Ophibolus triangulus mexicanus; Coronella mexicana; Oreophis boulengeri*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Fjellskog og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Varmeplass	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**10-14 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-5 egg**
Inkubasjon	**60-70 dager** ved 25-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av akkurat *Lampropeltis mexicana*. Stellet bygger på klimaet i høylandet og på de nært beslektede fjellkongeslangene, særlig *Lampropeltis alterna*.

TEMPERATUR

Terrariet må ha en tydelig temperaturgradient, slik at dyret selv kan velge sted. Om dagen er luften i terrariet 20-26 °C, med 20-22 °C i den kjølige enden og 28-30 °C på overflaten under varmekilden.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten er 40-60 %, og terrariet ventileres godt. Bunnen er tørr til lett fuktig, og høyere verdier over lengre tid gir hudproblemer og luftveisinfeksjoner.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og skjult og får i naturen bare lite direkte sollys. UVB er ikke nødvendig, men anbefales av hensyn til velferden.

FÔRING

I naturen er dagaktive øgler hovedføden, men i fangenskap eter dyrene som regel tinte, frosne mus, som er den sikreste kosten. Tilby ikke levende gnagere, for de kan bite og skade slangen.

ATFERD OG HÅNDTERING

L. mexicana er tilbakeholden og nervøs i starten, men venner seg som regel til håndtering. Gi et nytt dyr omtrent to uker i fred, og start først håndtering når det eter regelmessig.

NATURLIG UTBREDELSE

Mexico.