herpy

SLANGER

Black Kingsnake

Lampropeltis nigra

Lampropeltis nigra er en middels stor til stor kongeslange fra det østlige USA, svart, og i den sørlige delen av utbredelsen har hvert skjell en liten gul eller hvit flekk. Den blir 90-120 cm, spiser gnagere, øgler, frosker og andre slanger og er robust og lett å stelle. Den stelles enkeltvis i et gulvterrarium med varmeplass og moderat luftfuktighet og kan bli over 20 år.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Lampropeltis getula nigra; Ophibolus getulus niger*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**90-120 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-25 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**21-28 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-15 egg**
Inkubasjon	**60-70 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes lite artsspesifikk kunnskap om stell av *Lampropeltis nigra*. Tallene her er lånt fra kongeslanger generelt, særlig *Lampropeltis californiae* og *Lampropeltis getula*, som har samme krav.
TEMPERATUR	Dyret regulerer temperaturen sin ved å bevege seg mellom varme og kalde steder, så terrariet må ha en tydelig gradient. Overflaten under varmelampen skal være 29-32 °C, målt med et infrarødt termometer, og den kalde enden 21-26 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 40-60 %, målt med et digitalt hygrometer midt i terrariet. Den er høyere i den kalde enden og om natten og lavere i den varme enden, og det er normalt. Klam luft skal unngås.
LYS OG UVB	Arten er mest aktiv om dagen og soler seg i naturen. Den kan klare seg uten UVB, men UVB anbefales for best mulig velferd. Det passer til Ferguson-sone 2.
FÔRING	*L. nigra* er kjøttetende og skal ha hele byttedyr. Mus er standardfôr, og når dyret vokser, brukes unge rotter.
ATFERD OG HÅNDTERING	*L. nigra* er robust og tolerant. Gi et nytt dyr omtrent 2 uker i fred, og start først håndtering når det spiser regelmessig. Begynn med korte omganger på høyst 5 minutter, og løft dyret nedenfra, med støtte under kroppen.
NATURLIG UTBREDELSE	USA.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/slanger/lampropeltis-nigra