herpy

SLANGER

Lampropeltis triangulum

Lampropeltis triangulum er en slank, hemmelighetsfull snok fra det østlige Nord-Amerika. Navnet dekket lenge en hel gruppe fargerike slanger, og mange av dem som selges under det, hører i dag til andre arter. Slangen er nattaktiv, rolig og lett å holde, men lever av gnagere og må ikke bo sammen med andre slanger.

Familie: Colubridae Engelsk: Eastern milksnake Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**55-115 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Vinterhvile	**11-13 °C** 10-12 uker
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36-48 mnd.**
Kullstørrelse	**2-24 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**58-65 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

En voksen *Lampropeltis triangulum* må ha et terrarium på minst 120 × 60 × 45 cm. Små dyr under 90 cm klarer seg med 90 × 45 × 45 cm. Unger kan starte i en liten boks og flyttes opp i takt med veksten.

TEMPERATUR

Lampropeltis triangulum er nattaktiv og varmer seg mest under steiner og andre gjenstander som sola har varmet opp, men soler seg av og til åpent.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

En relativ luftfuktighet på 40-60 % er passende. Den kan gjerne være høyere i den kjølige enden og om natten og lavere i den varme enden. Mål midt i terrariet med et digitalt hygrometer.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og trenger ikke sterkt lys. UVB er ikke nødvendig, men kan være gunstig. En UVB-lampe (T5 HO, 5-6 %) som dekker halve terrariet over den varme enden, gir bedre velferd når slangen samtidig kan søke skygge.

FÔRING

Voksne *Lampropeltis triangulum* fôres med mus og unge rotter, og store individer tar små til middels store rotter. Byttet skal være frossent og tint og ikke over 1,5 ganger så bredt som slangens bredeste sted.

ATFERD OG HÅNDTERING

Lampropeltis triangulum er som regel rolig og tåler håndtering godt, men enkelte dyr er nervøse og biter. Etter hjemkomsten får dyret en til to uker til å falle til ro, og håndteringen begynner først når det spiser regelmessig.

NATURLIG UTBREDELSE

Canada og USA.