herpy

SLANGER

Grønn trepyton

Morelia viridis

Morelia viridis er en lysegrønn, trelevende pyton fra regnskogene på det sørlige Ny-Guinea og Cape York, som hviler i tette løkker over en gren og slår ned på byttet fra et fast utkikkspunkt. Ungene er gule og skifter til grønt i løpet av det første leveåret. Arten er vakker og holdbar, men stiller krav til fuktighet, ro og håndtering.

Familie: Pythonidae Engelsk: Green Tree Python Tidligere navn: *Chondropython viridis; Python viridis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**100-160 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**90 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**27-31 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**29-43 mnd.**
Kullstørrelse	**6-32 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**39-65 dager** ved 29-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr må ha et terrarium på minst 90 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Større er bedre, og 120 × 60 × 60 cm er et godt mål til en voksen hunn.
TEMPERATUR	Det skal være en tydelig gradient. Solplassen på den øverste grenen skal være 27-31 °C og den kjøligere delen av terrariet 24-26 °C. Om natten slås varmen av, og temperaturen kan falle til 20-22 °C, men ikke under 20 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 40-70 % og variere: høyere rett etter sprøyting og deretter fallende til omtrent 40 %, før det sprøytes igjen.
LYS OG UVB	Unge dyr er dagaktive, og voksne dyr er mest aktive i skumringen og om natten, men begge har nytte av klart dagslys. Lyset skal være på 12 timer i døgnet og slås helt av om natten.
FÔRING	*M. viridis* spiser hele byttedyr. Voksne dyr får mus, små rotter, hamstere, gerbiler og vaktler, gjerne i variasjon, og unger får små mus. Byttet skal være tint fra frost og varmet til omtrent 38 °C.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Morelia viridis* er sky og stedbundet. Den blir sjelden like tam som mange snoker og skal ikke håndteres hver dag. Den har rykte på seg for å bite, men det er oftest en følge av hard behandling.
NATURLIG UTBREDELSE	Indonesia, Papua Ny-Guinea og Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/slanger/morelia-viridis