herpy

SLANGER

Thamnophis sirtalis

Thamnophis sirtalis er en slank, dagaktiv og nysgjerrig slange med lyse striper langs kroppen. Den lever ved vann fra det sørlige Canada gjennom det meste av USA til det nordlige Mexico. Den er hardfør, holder seg våken og synlig om dagen og kan leve av opptinte mus, men den er en mester i å rømme og krever et helt tett terrarium.

Familie: Colubridae Engelsk: Common Garter Snake Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**50-100 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**6-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Nybegynner**

STELL

Min. terrarium	**100 × 50 × 50 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**35-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**8-15 °C** 8-16 uker
Kosthold	**Virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**18-24 mnd.**
Kullstørrelse	**10-40 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**60-90 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
En voksen *Thamnophis sirtalis* trenger et terrarium på minst 100 × 50 × 50 cm (lengde × bredde × høyde), og en hunn over 80 cm trenger 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Det må være en tydelig varmegradient. Soleplassen skal være 29-32 °C målt på overflaten, den kjølige enden 23-27 °C og natten 18-22 °C. Varmekilden slås av om natten.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal ligge på 35-60 %, høyest i den kjølige enden og om natten. Terrariet skal ikke være vått, for vedvarende fukt gir blemmer på buken.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og trives med kraftig dagslys. UVB er ikke strengt nødvendig, men anbefales og gjør ofte slangen mer aktiv.

FÔRING
Thamnophis sirtalis tar andre byttedyr enn de fleste slanger: meitemark, fisk og gnagere. Insekter som siklader og melorm spiser den ikke.

ATFERD OG HÅNDTERING
Thamnophis sirtalis er rask og nysgjerrig og blir som regel tam hvis den håndteres jevnlig fra ung. La nye dyr falle til i omtrent to uker, og begynn først å håndtere dem når de spiser fast.

NATURLIG UTBREDELSE
Canada, Mexico og USA.