herpy

STÅLORMER

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata er en brun, trelevende slangeøgle med tornlignende skjell over øret fra tåkeskogene i Guatemalas nordøstlige høyland. Den blir omtrent 25-35 cm, føder levende unger og spiser insekter. Den krever et høyt, luftig terrarium med mose og bromelier og kjølige temperaturer. Arten er truet, og pasningen er bare sparsomt beskrevet.

Familie: Anguidae Tidligere navn: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-35 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**50 × 50 × 75 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-27 °C**
Varmeplass	**26-30 °C**
Temperatur, natt	**10-18 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**24-36 mnd.**
Kullstørrelse	**4 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**180-240 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste I**
EU-vedlegg	**Vedlegg A**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Pasningen av *Abronia fimbriata* er bare sparsomt beskrevet, og tallene her er lånt fra den nært beslektede *Abronia graminea*, som er den best kjente arten i slekten.

TEMPERATUR

Abronia fimbriata tåler ikke varme. Dagtemperaturen skal ligge på 20-27 °C, og solplassen under en svak spot kan være 26-30 °C. Dyret er mest aktivt ved 24-27 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Den relative luftfuktigheten skal ligge på 60-80 %, med de høyeste verdiene om natten og etter sprøyting. Sprøyt planter, vegger og dyrene lett nesten hver dag, gjerne med en trykksprøyte eller et tåkeanlegg som gir en fin tåke.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og trenger UVB. Det beste er naturlig, ufiltrert sollys, for eksempel i et nettingbur utendørs i tørt vær om sommeren med skygge og kjølig underlag, slik at dyret kan flytte seg.

FÔRING

Abronia fimbriata lever av insekter og andre smådyr. Gi sirisser, gresshopper, melorm, kakerlakker, snegler, edderkopper og bløte larver, for eksempel grønne sommerfuglarver og fluelarver med høyt kalkinnhold.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er stille og sky. Dyret bruker det meste av dagen på å sitte stille på en gren eller i en bromelie og soler seg i korte perioder. Det er ikke et dyr som skal håndteres.

NATURLIG UTBREDELSE

Guatemala.