herpy

STÅLORMER

stålorm

Anguis fragilis

Anguis fragilis er en beinløs, blank øgle på 40-50 cm som lever skjult under steiner, tre og tett vegetasjon i det vestlige og sentrale Europa. Den ligner en slange, men har øyelokk og kan kaste halen. Den lever av snegler og meitemark, føder levende unger og kan bli svært gammel. Den krever et kjølig, fuktig terrarium eller utendørsanlegg med dyp bunn, mange skjul og en ordentlig vinterdvale.

Familie: Anguidae Engelsk: Slow Worm

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**40-50 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**20-100 g**
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**80 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Varmeplass	**25-30 °C**
Temperatur, natt	**10-15 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Vinterhvile	**4-8 °C** 16-20 uker
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**36-48 mnd.**
Kullstørrelse	**6-12 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**80-100 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Pasningen av *Anguis fragilis* er bare sparsomt beskrevet, men arten er robust og yngler villig når forholdene er riktige. Tallene her bygger på artens levevis og klima.

TEMPERATUR

Arten tåler ikke sterk varme. Dagtemperaturen skal ligge på 18-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 60-80 %. Bunnen skal være lett fuktig i dybden, men aldri våt, og den øverste delen kan gjerne tørke litt mellom hver sprøyting. Sprøyt lett hver eller annenhver dag, og hold mosen fuktig.

LYS OG UVB

Arten er mest aktiv om morgenen og i skumringen og soler seg mest indirekte. UVB er derfor ikke nødvendig, men et svakt UVB-rør (Ferguson-sone 1) over den ene enden gir dyret mulighet til å velge, så lenge det er mange skjul.

FÔRING

Anguis fragilis lever av trege byttedyr og foretrekker små, grå åkersnegler framfor alt annet. Den tar også andre nakne snegler, meitemark, stankelbeinlarver, fluelarver, edderkopper og små snegler med hus.

ATFERD OG HÅNDTERING

Anguis fragilis er rolig og tilbringer mesteparten av tiden i bunnen eller under skjul, ofte med bare hodet stikkende opp. Nye dyr vrir seg voldsomt når de tas opp, men blir raskt rolige og snor seg om fingrene for å holde fast.

NATURLIG UTBREDELSE

Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Nederland, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Sveits, Liechtenstein, Østerrike, Tsjekkia, Polen, Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia og Nord-Makedonia.