herpy

STÅLORMER

Gila Monster

Heloderma suspectum

Heloderma suspectum er en kraftig, langsom øgle fra ørkenene i det sørvestlige USA og det nordvestlige Mexico, svart med lyserøde eller gule bånd og dekket av perleformede skjell. Den er giftig: et bitt er en akutt medisinsk nødsituasjon, og arten krever erfaring, faste rutiner og sikker håndtering. Den blir 35-55 cm, graver, lever av egg og små virveldyr og kan bli over 20 år.

Familie: Helodermatidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**35-55 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**500-800 g**
Levealder	**20-30 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Klippelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**150 × 70 × 50 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**10-15 °C** 13-17 uker
Kosthold	**Virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**36-60 mnd.**
Kullstørrelse	**3-7 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**134-155 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 150 × 70 × 50 cm (lengde × bredde × høyde). Målet er et anslag ut fra dyrets størrelse og levesett.
TEMPERATUR	Om dagen skal terrariet ha en gradient fra 22 °C i den kjølige enden til 32 °C under varmelampen, slik at dyret selv kan velge. Aktive dyr holder en kroppstemperatur omkring 30 °C. Om natten faller temperaturen til 20-24 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten ligger på 40-60 %, og en del av underlaget holdes lett fuktig, slik at dyret kan grave seg ned i fuktigere jord.
LYS OG UVB	Arten er aktiv om dagen og i skumringen. Lyset slås på 10-13 timer om dagen, kortest i periodene før og etter vinterdvalen og slått av under den. UVB anbefales: en UVB-spot eller et UVB-rør ved varmestedet.
FÔRING	I naturen tar arten små pattedyr, unger fra reder, fugler, øgler, slanger, frosker og insekter og særlig egg fra fugler og krypdyr. Den spiser få, store måltider i året og lever av fettet i halen og bukhulen.
ATFERD OG HÅNDTERING	SIKKERHET: dyret er giftig, og den største feilen er å stole på at det er langsomt og tamt. Et bitt kommer uten varsel, også fra et dyr som har tatt fôr fra pinsetten i årevis. Bruk disse reglene: Rør aldri dyret med bare hender.
NATURLIG UTBREDELSE	USA og Mexico.