herpy

STÅLORMER

Eastern Glass Lizard

Ophisaurus ventralis

Ophisaurus ventralis er en lang, benløs glassøgle fra kystslettene i det sørøstlige USA. Den blir opptil omtrent 108 cm, hvorav over to tredjedeler er hale, og lever skjult i fuktige, sandige skoger og enger. Den ligner en slange. Den krever et romslig terrarium med dyp, gravbar bunn, en varm flekk og variert føde av insekter, snegler og meitemark.

Familie: Anguidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**45-108 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**4-15 år**
Aktiv	**Om dagen og i skumringen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-29 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-75 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**12-16 °C** 6-10 uker
Kosthold	**Insekter, virveldyr og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24 mnd.**
Kullstørrelse	**5-17 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**50-65 dager** ved 26-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Ophisaurus ventralis*, og arten holdes sjelden. Tallene bygger på artens levested og på de øvrige glassøglene i slekten, og det står i teksten hvor de er anslag.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være 22-29 °C, med en solplass på 30-32 °C målt på overflaten med et IR-termometer og omtrent 24 °C i den kjølige enden. Om natten faller temperaturen med 3-6 grader til 18-22 °C, og varmen slås av.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 60-75 %. Arten lever på fuktig, sandig bunn, så en del av bunnen skal være lett fuktig, mens resten tørker ut, slik at dyret kan velge.

LYS OG UVB

Arten soler seg i naturen og foretrekker halvskygge. Gi et UVB-rør for Ferguson-sone 2 over solplassen, slik at dyret selv kan velge å gå inn i lyset, og en UV-indeks på 2-3 ved solplassen. Det er et anslag.

FÔRING

Ophisaurus ventralis er en opportunistisk kjøttetende art som særlig tar insekter og andre smådyr, men også snegler, meitemark, små slanger og egg. Kjevene er ikke fleksible, så byttet må være lite nok til å svelges helt.

ATFERD OG HÅNDTERING

Ophisaurus ventralis er rolig, men liker ikke å bli håndtert. Når den blir grepet, vrir den seg, kan bite og kaster lett halen, så løft aldri dyret i halen. Støtt hele kroppen, og la nye dyr få et par ukers ro før de håndteres.

NATURLIG UTBREDELSE

USA.