herpy

STÅLORMER

Checkerboard Worm Lizard

Trogonophis wiegmanni

Trogonophis wiegmanni er en liten, beinløs ormeøgle fra Marokko, Algerie og Tunisia, som lever hele livet nedgravd i sandjord og under stein. Dyret er 12-18 cm fra snute til kloakk, har en kort, kjegleformet hale og et sjakkrutet mønster. Arten føder levende unger og krever en dyp, lett fuktig bunn, jevn varme nedenfra og ro. Det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Trogonophidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-18 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Gravende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**30 mnd.**
Kullstørrelse	**2-5 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**120-150 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Trogonophis wiegmanni*.
TEMPERATUR	Dyrene varmer seg ved å ligge nedgravd i oppvarmet jord og ikke i lysets varme.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Det er fuktigheten i bunnen som teller, ikke i luften. Bunnen skal være lett fuktig hele veien ned: den skal kunne holde en form når den presses i hånden, men ikke dryppe. Sprøyt bunnen med vann hver dag.
LYS OG UVB	Dyrene ligger nedgravd og ses ikke i lyset. UVB er ikke nødvendig.
FÔRING	*Trogonophis wiegmanni* er en kjøttspiser som spiser insekter og andre små, jordlevende virvelløse dyr. I naturen er insektlarver og snegler de foretrukne byttedyrene, mens maur og skrukketroll nesten blir ignorert.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Trogonophis wiegmanni* ses sjelden. Dyrene ligger nedgravd og kommer bare frem under flisen. Det er normalt. Ikke grav etter dyrene for å sjekke dem, for forstyrrelse og stress gjør dem mindre aktive.
NATURLIG UTBREDELSE	Marokko, Algerie og Tunisia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/stalormer/trogonophis-wiegmanni