herpy

VARANER

Varanus beccarii

En liten, svart trelevende varan fra Aru-øyene utenfor Ny-Guinea med gripehale og uvanlig lange forbein, som den bruker som hender når den jakter. Dyret er nervøst, krever et høyt og varmt terrarium med høy luftfuktighet og er vanskelig å få til å formere seg, så det passer bare for en erfaren holder.

Familie: Varanidae Engelsk: Black Tree Monitor Tidligere navn: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**80-120 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**220-300 g**
Levealder	**10-17 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**55-70 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3 egg**
Inkubasjon	**157-203 dager** ved 29-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Datamangel (DD)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr må ha et høyt terrarium på minst 150 × 100 × 150 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet skal ligge omtrent 26-30 °C, men kan gjerne variere fra 24 til 35 °C på tvers av terrariet. Under en varmelampe skal det være en solplass på 35-40 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten i fangenskap ligger oftest på 55-70 % med svingninger i løpet av dagen. Sprøyt bunnen daglig med ferskt vann, slik at luftfuktigheten stiger, og la den tørke litt opp igjen i løpet av dagen.
LYS OG UVB	*Varanus beccarii* er dagaktiv og bør ha UVB-lys. Dokumenterte oppsett bruker en kombinert varme- og UVB-lampe på 100-160 W over solplassen, i noen tilfeller supplert med filtrert dagslys.
FÔRING	Arten lever mest av levende insekter. Dokumentert fôr til voksne er kakerlakker (f.eks. *Blaptica dubia*), supplert med melorm, superorm (*Zophobas morio*), siriketter og larver av rosenbiller (*Pachnoda*).
ATFERD OG HÅNDTERING	*Varanus beccarii* er nervøs og blir lett stresset av håndtering. Bitt og klør er en reell risiko: tennene er lange, klørne skarpe, og et skremt dyr kan også sparke og avgi avføring på den som holder det. Arten slår ikke med halen.
NATURLIG UTBREDELSE	Indonesia.