herpy

VARANER

Varanus boehmei

En slank, svart trevaran med gylne flekker i V-formede rader, som bare finnes på øya Waigeo utenfor Ny-Guinea. Arten er sjelden i fangenskap og dårlig kjent, så pleieveiledningen her bygger på tall fra nære slektninger. Den krever et stort, høyt og fuktig terrarium, daglig sprøyting og en holder med erfaring.

Familie: Varanidae Engelsk: Golden speckled tree monitor Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**70-90 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**150 × 100 × 150 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Varmeplass	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3 egg**
Inkubasjon	**157-161 dager** ved 29-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Datamangel (DD)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Varanus boehmei* er en klatrer, så høyden er viktigere enn gulvarealet. Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 150 × 100 × 150 cm (lengde × bredde × høyde), og et par skal ha mer, gjerne omkring 160 × 120 × 180 cm.
TEMPERATUR	Tallene for *Varanus boehmei* er lånt fra *V. beccarii* og andre arter i gruppen. Om dagen skal lufttemperaturen være 24-34 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Arter i *V. prasinus*-gruppen tørker lett ut og er vanskeligere å holde enn mange andre varaner.
LYS OG UVB	*Varanus boehmei* er trolig dagaktiv og soler seg høyt oppe i trærne, så lys er både varme og UVB.
FÔRING	Slektninger i gruppen lever mest av insekter og andre virvelløse dyr, og det gjelder trolig også *Varanus boehmei*.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Varanus boehmei* er liten og lett bygd, og et voksent dyr på 70-90 cm har skarpe klør og kan bite, men skadene kan ikke sammenlignes med dem fra store varaner.
NATURLIG UTBREDELSE	Indonesia.