herpy

VARANER

**Bogert's Monitor**

# *Varanus bogerti*

*Varanus bogerti* er en svart, trelevende varan fra øyene utenfor den sørøstlige spissen av Ny-Guinea, og den hører til gruppen av trevaraner rundt *Varanus prasinus*. Arten er bare kjent fra en håndfull museumsdyr og nesten ukjent i fangenskap, så stellet bygger på de nærmeste slektningene.

Familie: Varanidae  Tidligere navn: *Varanus prasinus bogerti*

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **82-94 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **10-15 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Trelevende** |
| Biotop | **Regnskog og våtmark** |
| Vanskelighetsgrad | **Ekspert** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 80 × 180 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-34 °C** |
| Varmeplass | **45-50 °C** |
| Temperatur, natt | **22-25 °C** |
| Luftfuktighet | **70-95 %** |
| UVB | **Anbefalt**<br>Ferguson-sone 2 |
| Kosthold | **Insekter og virveldyr** |
| Holdes | **Alene eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kullstørrelse | **2-3 egg** |
| Inkubasjon | **157-203 dager**<br>ved 29-30 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| EU-vedlegg | **Vedlegg B** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Varanus bogerti*, og arten er nesten ikke sett i fangenskap. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen skal temperaturen være 24-34 °C og om natten 22-25 °C. Overflatetemperaturen på solplassene skal være 45-50 °C. |
| **LUFTFUKTIGHET OG VANN** | Luftfuktigheten skal være 70-95 %. Spray terrariet flere ganger i døgnet med friskt vann, gjerne med et automatisk anlegg, og la bunnen tørke litt opp mellom sprayingene. Dyrene drikker vanndråper fra blader og greiner. |
| **LYS OG UVB** | Arten er dagaktiv og må ha UVB-lys. Bruk en kombinert varme- og UVB-lampe over solplassen, slik at dyret kan velge mellom skygge og lys, og sikt mot Ferguson-sone 2. |
| **FÔRING** | Fôringen er lånt fra *V. beccarii* og *V. prasinus*, som hovedsakelig spiser store leddyr. |
| **ATFERD OG HÅNDTERING** | Arten er sannsynligvis sky og nervøs som andre trevaraner, og håndtering stresser dyret. Bitt og klør er en reell risiko: tennene er skarpe, klørne er lange, og et forskrekket dyr kan også gjøre fra seg på den som holder det. |
| **NATURLIG UTBREDELSE** | Papua Ny-Guinea. |

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/varaner/varanus-bogerti