herpy

VARANER

Varanus glauerti

En slank, langbeint klippevaran fra Kimberley i det nordvestlige Australia, med mørkt hode, blågrå øyeflekker på ryggen og en hale med skarpe svarte og hvite bånd. *Varanus glauerti* blir bare 60-80 cm, men den er krevende: den må ha et stort, varmt og høyt terrarium med klippeflater og sprekker, og holderen må ha erfaring med UVB, eggruging og sky dyr.

Familie: Varanidae Engelsk: Kimberley Rock Monitor Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**60-80 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og klippelevende**
Biotop	**Savanne og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**150 × 80 × 100 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-32 °C**
Varmeplass	**45-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-9 egg**
Kull per år	**1-4**
Inkubasjon	**104-110 dager** ved 28,5-29,5 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent dyr må ha et terrarium på minst 150 × 80 × 100 cm (lengde × bredde × høyde). Et par bør helst ha 190 × 100 × 105 cm. Større er bedre, fordi dyret klatrer, løper og trenger en tydelig temperaturgradient.

TEMPERATUR
Varanus glauerti soler seg mye og må ha varme solplasser. Overflatetemperaturen på solplassen, målt med IR-termometer, skal være 45-55 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal være 50-80 %, gjerne 60-80 % for dyr i avl. Oppgavene for sprøyting varierer fra to ganger i uka til daglig. Ungene er mer aktive ved høy fuktighet og bør sprøytes daglig.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og krever kraftig UVB-lys (Ferguson-sone 3).

FÔRING
Arten lever mest av insekter. Voksne dyr fôres 3-4 ganger i uka med siriketter, dubia-kakerlakker, gresshopper og hornorm, og en gang iblant en halvvoksen mus eller en nyfødt rotteunge.

ATFERD OG HÅNDTERING
Arten er sky og må venne seg til håndtering langsomt. De første ukene etter hjemkomsten må dyret ha ro.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.