herpy

VARANER

Varanus jobiensis

Varanus jobiensis er en middels stor, dagaktiv varan fra regnskogen på Ny-Guinea og de nærliggende øyene, kjent for den kvitgule til røde strupen. Arten blir opptil omtrent 120 cm, graver gjerne og trenger et romslig, fuktig og varmt terrarium. Den hører hjemme hos den erfarne holderen, og bare få dyr i handelen er oppdrettet.

Familie: Varanidae Engelsk: Peach-throated monitor Tidligere navn: *Varanus karlschmidti; Varanus indicus jobiensis* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**100-120 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**240 × 90 × 200 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Varmeplass	**35-54 °C**
Temperatur, natt	**23-25 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-5 egg**
Inkubasjon	**179-181 dager** ved 29-32 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et voksent dyr skal ha et svært stort terrarium på minst 240 × 90 × 200 cm (lengde × bredde × høyde), gjerne 240 cm høyt, og et par trenger mer. Jo større, jo bedre, fordi arten er aktiv og bruker hele arealet.

TEMPERATUR

Varanus jobiensis skal ha en stor temperaturgradient. Om dagen skal lufttemperaturen være 26-29 °C, og det skal være flere solplasser med overflatetemperaturer på 35-54 °C, oppvarmet med 65-90 W utendørs spotlamper.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Arten kommer fra regnskog, og det skal terrariet gjenspeile. Sprøyt hele terrariet kraftig i flere minutter hver dag, for eksempel med en hageslange, så bunnen holder seg fuktig.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og trenger kraftig lys og UVB. Bruk en UVB-kilde med høy intensitet som til andre varaner, for eksempel kvikksølvdamplamper, som gir både varme og UV, eller kraftige UVB-rør av høy kvalitet.

FÔRING

I naturen er insekter hovedføden, supplert med frosker, andre virvelløse dyr og krypdyregg. I fangenskap tar dyrene unge mus og kakerlakker (*Blaptica dubia*).

ATFERD OG HÅNDTERING

Sikkerhet og håndtering: *Varanus jobiensis* er rask og sterk og har kraftige klør og tenner. Bitt og rifter fra klørne hos et dyr på omkring en meter kan være dype og skal renses grundig.

NATURLIG UTBREDELSE

Indonesia og Papua Ny-Guinea.