herpy

VARANER

Varanus kordensis

Varanus kordensis er en slank, grønn trelevende varan med et nett av mørke ringflekker, og den lever bare på øya Biak nord for Ny-Guinea. Den hører til en gruppe trevaraner som er kjent for å være vanskelige å holde og avle, og det finnes nesten ingen detaljerte pleietall for akkurat denne arten.

Familie: Varanidae Engelsk: Biak Emerald Monitor Tidligere navn: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**70-90 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Ekspert**

STELL

Min. terrarium	**120 × 80 × 180 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-34 °C**
Varmeplass	**45-50 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**75-95 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**2-5 egg**
Kull per år	**1-3**
Inkubasjon	**160-190 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Datamangel (DD)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Stellet av *Varanus kordensis* er nesten det samme som for de andre grønne trevaranene: et stort, høyt terrarium med mange skjul, tykke greiner og korkrør. Tallene i dette avsnittet er lånt fra den nærbeslektede *Varanus beccarii*.

TEMPERATUR

Temperaturene er lånt fra *Varanus beccarii* og er et forsiktig utgangspunkt for *Varanus kordensis*. Om dagen skal temperaturen være 24-34 °C og om natten 22-25 °C. Overflatetemperaturen under solplassene skal være over 45 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være høy, omkring 75-95 %, og bør ikke komme under 75 %. Tørre forhold gir uttørking og problemer med hudskiftet.

LYS OG UVB

Varanus kordensis er dagaktiv og soler seg i trekronene. Behovet for UVB er ikke kjent for arten, men UVB anbefales. Et terrarium til et par kan belyses med to 75 W og en 150 W metalldamplampe (HQI) samt to halogenspotter.

FÔRING

Varanus kordensis lever mest av insekter. I fangenskap består grunnfôret av sirisser, kakerlakker, gresshopper og egg, og kylling, kjøtt, reker og gnagere gis bare av og til.

ATFERD OG HÅNDTERING

Varanus kordensis er så liten at et bitt sjelden er alvorlig, men klørne er skarpe og kan gi dype rifter, og halen brukes til å gripe med, ikke til å piske. Dyrene er raske og sky og flykter heller enn å bite.

NATURLIG UTBREDELSE

Indonesia.