herpy

VARANER

Varanus similis

Varanus similis er en liten, dagaktiv trevaran fra Nord-Australia og Ny-Guinea. Den holdes i et høyt terrarium med kork, skjul og en varm soleplass, lever av fôrinsekter og er et sjeldent, trelevende alternativ til de bakkelevende små varanene. Erfaringen med stellet er likevel liten.

Familie: Varanidae Engelsk: Spotted Tree Monitor Tidligere navn: *Varanus timorensis similis; Varanus scalaris similis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**45-60 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**80 × 80 × 130 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**40-42 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24 mnd.**
Kullstørrelse	**3-18 egg**
Inkubasjon	**120-136 dager** ved 28-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr trenger et høyt terrarium på minst 80 × 80 × 130 cm (lengde × bredde × høyde). Til et par er 100 × 100 × 200 cm rikelig, men ikke overdrevent. Siden arten er trelevende, teller høyden mer enn gulvarealet.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet er 25-30 °C, med 30 °C i de øvre delene og 25 °C nede ved bunnen. Soleplassen er en grein eller stein under en spotlampe som gir en lokal overflatetemperatur på ca. 40 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Den relative luftfuktigheten holdes på 60-80 %. Det oppnås ved å spraye terrariet med vann om kvelden og la bunnlaget holde på fukten, eventuelt med en svak varmekabel under bunnen.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og trenger kraftig lys og UVB. Over soleplassen kan en 150 W HQI-flomlampe med dagslyskvalitet (5000 K) sitte sammen med en 150 W halogenspot.
FÔRING	Dyrene tar alle vanlige fôrinsekter og er ikke kresne. Kakerlakker (*Blaptica dubia* og *Blaberus atropus*) i passende størrelse egner seg som hovedfôr, og gresshopper er en populær variasjon.
ATFERD OG HÅNDTERING	Villfangede dyr er sky i begynnelsen, men det er naturlig atferd: arten flykter eller gjemmer seg til trusselen er over, og jakter fra bakhold. Det betyr ikke at arten er ekstra fryktsom.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia og Papua Ny-Guinea.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/varaner/varanus-similis