herpy

AGAMY

Brown Pricklenape

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster to szarozielona do brązowej agama leśna z kolcem za każdym okiem i niskim grzebieniem kolców na karku. Występuje od południowych Chin przez Wietnam i Laos po Tajlandię i Mjanmę. Gatunek osiąga 20-28 cm, żyje w zaroślach i na dnie lasu i potrzebuje wilgotnego, stosunkowo chłodnego terrarium, w którym powietrze nie nagrzewa się powyżej 28 °C.

Rodzina: Agamidae Dawna nazwa: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**20-28 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**100 × 50 × 100 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**20-26 °C**
Miejsce wygrzewania	**28-30 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Część wodna**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**6-12 jaj**
Inkubacja	**110-130 dni** przy 25-27 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 100 × 50 × 100 cm (długość × szerokość × wysokość). Gatunek korzysta zarówno z gałęzi, jak i z dna, więc powierzchnia podłogi jest równie ważna jak wysokość.

TEMPERATURA

Acanthosaura lepidogaster źle znosi upał. Temperatura powietrza w terrarium powinna wynosić 20-26 °C w dzień i nie może przekraczać 28 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 70-80 % w dzień, a w nocy najlepiej około 90 %. Dokładnie zraszaj terrarium miękką wodą 2-3 razy dziennie, tak aby na roślinach i ścianach wisiały krople.

OŚWIETLENIE I UVB

Gatunek jest aktywny w dzień, ale żyje w cieniu lasu i potrzebuje tylko słabego UVB. Użyj świetlówki T5 HO 6 % (strefa Fergusona 2) w odbłyśniku nad siatką, obejmującej około połowy długości terrarium.

ŻYWIENIE

Gatunek żywi się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami. Podawaj urozmaiconą dietę ze świerszczy, karaczanów, szarańczy, jedwabników, dżdżownic i małych nagich ślimaków.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Acanthosaura lepidogaster to spokojna agama leśna, która często siedzi zupełnie nieruchomo na gałęzi, pniu lub na dnie. Rzadko porusza się szybko. Przestraszona ciemnieje, rozkłada grzebień karkowy lub otwiera pysk.

NATURALNY ZASIĘG

Chiny, Laos, Mjanma (Birma), Tajlandia i Wietnam.