herpy

AGAMY

Agama kołnierzasta

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii to duża, nadrzewna agama z północnej Australii i południowej Nowej Gwinei. Słynie z dużego skórnego kołnierza wokół szyi, który rozkłada w groźnej postawie obronnej. Osiąga 60-90 cm, jest aktywna w dzień i żywi się owadami. W zamian wymaga bardzo wysokiego terrarium, mocnego grzania i UVB, a do tego jest płochliwa i łatwo się stresuje.

Rodzina: Agamidae Nazwa angielska: Frilled Lizard Dawna nazwa: *Clamydosaurus kingii*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**60-90 cm** długość całkowita z ogonem
Waga	**400-870 g**
Długość życia	**8-10 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**150 × 75 × 150 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**27-32 °C**
Miejsce wygrzewania	**38-42 °C**
Temperatura w nocy	**23-27 °C**
Wilgotność	**60-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**24-36 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**4-20 jaj**
Zniesienia w roku	**2-4**
Inkubacja	**70-110 dni** przy 28-29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosłe zwierzę potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 150 × 75 × 150 cm (długość × szerokość × wysokość).
TEMPERATURA	Miejsce do wygrzewania powinno znajdować się na górze terrarium i mieć temperaturę powierzchni 38-42 °C, przy czym punktem wyjścia jest około 40 °C.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-70 %, a terrarium trzeba zraszać. Gatunek żyje w klimacie z obfitymi letnimi deszczami i pije krople wody. Najlepiej sprawdza się system zraszający, uruchamiany kilka razy dziennie.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i wygrzewa się, dlatego potrzebuje mocnego światła nad całym terrarium oraz miejsca do wygrzewania z lampą grzewczą i UVB.
ŻYWIENIE	*Chlamydosaurus kingii* jest owadożerna. Pokarm stanowią świerszcze, karaczany, gąsienice motyli, jedwabniki i pojedyncze drewnojady. Termity i mrówki są najważniejszą zdobyczą w naturze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*C. kingii* jest w terrarium spokojna i mało ruchliwa, ale płochliwa wobec ruchu w pomieszczeniu. Niektóre osobniki tolerują wyjmowanie, ale branie na ręce łatwo je stresuje, a zwierzę może syczeć, rozkładać kołnierz i gryźć.
NATURALNY ZASIĘG	Australia, Papua-Nowa Gwinea i Indonezja.